肌あれ・にきび　口内炎・疲れに

販売名
マスチゲン®BBチュアブル錠

水なしでポリポリとかんで服用

マンゴー味

第3類医薬品

12錠入

服用は1日1回

ビタミンC・ビタミンB_2・ビタミンB_6配合の、肌あれ・にきび・口内炎・疲れに効く、水なしでポリポリとかんで服用する医薬品のチュアブル錠です。

特　長

1. チュアブル錠は、水なしでポリポリとかんで服用できますので、職場や学校で手軽に症状の改善効果を得られます。
2. お肌の真皮層を形成するコラーゲンづくりを助けるビタミンC配合により肌あれを内側から治します。
3. 皮膚を正常な状態にもどすビタミンB_2配合により、ポツポツと赤くはれたニキビを体の中から治します。
4. ビタミンB_6の働きで、しみると痛い口内炎を改善します。
5. 疲れの栄養補給に効果的です。
6. 低カロリー・甘さひかえめ。
7. 外出時に携帯しやすいG錠入シート包装。

効能・効果

次の諸症状の緩和：肌あれ、にきび・吹き出物、口内炎、湿疹、口角炎(唇の両端の腫れ・ひび割れ)、皮膚炎、口唇炎(唇の腫れ・ひび割れ)、かぶれ、ただれ、赤ら顔に伴う顔のほてり、舌の炎症、目の充血、目のかゆみ

「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談すること。」

次の場合のビタミンB_2の補給：肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

用法・用量

7歳以上15歳未満1日1回1錠、15歳以上1日1回2錠をそのままかむか、口の中で溶かして服用して下さい。

朝・昼・晩いつ服用してもかまいません。水と一緒に服用することもできます。

用法用量に関連する注意

1. 本剤の使用により、尿が黄色くなることがありますが、配合されているビタミンB_2の一部が尿中に排泄されるためで心配はありません。2. 定められた用法・用量をお守り下さい。3. かむか、口の中で溶かして服用して下さい。4. 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。5. 図のようにシート包装の凸部を指先で押して錠剤を取り出して服用して下さい。誤ってシート包装のまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等の思わぬ事故につながりますのでご注意下さい。

おしだす

紙

成分　**含量(3.3キロカロリー)**

ビタミンB_6塩酸エステル……　20mg
ビタミンB_2……　50mg
ビタミンC……　250mg

皮膚や粘膜の組織の新陳代謝を助けます。
お肌のコラーゲンづくりを助けます。

添加物としてトウモロコシデンプン、粉末還元麦芽糖水アメ、スクラロース、ステアリン酸Mg、D-マンニトール、酸化防止剤(ビタミンE)、ヒドロキシプロピルセルロース、黄色5号、香料、パニリンを含みます。

使用期限

製造番号

4 987174 730017

販売元
日新薬品工業株式会社
大阪府大阪市中央区道修町2丁目2番8号
お客様相談室　TEL 06-6204-8711
土・日・祝日を除く　9:00~17:00

製造販売元
日新薬品工業株式会社
滋賀県甲賀市甲賀町田堵野80-1

原薬
日本臓器製薬株式会社
大阪府大阪市中央区道修町2丁目2番8号

厚生労働省承認番号
(販売名)
(22000)149-551

©2020日新薬品

肌あれ・にきび　口内炎・疲れに　第3類医薬品

マスチゲン®BBチュアブル錠

水なしでポリポリとかんで服用

12錠入

マンゴー味

開け口

肌あれ・にきび　口内炎・疲れに　第3類医薬品

マスチゲン®BBチュアブル錠

水なしでポリポリとかんで服用

12錠入

マンゴー味

マスチゲン®BBチュアブル錠

ビタミンC・B_2・B_6配合

服用は1日1回

実物大

水なしでポリポリとかんで服用

12錠入

マンゴー味

保管及び取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
2. 小児の手の届かない所に保管して下さい。
3. 他の容器に入れ替えないで下さい。誤用の原因になったり品質が変わります。
4. 使用期限の過ぎた製品、使用前に開封された形跡のある製品は服用しないで下さい。

ご使用に際して、この箱の裏面文書をよくお読み下さい。また、必要なときに読めるよう大切に保管して下さい。

A使用上の注意　必ず相談すること

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症状
消化器	胃部不快感、胃痛悪心嘔吐、食欲不振、吐き気、嘔吐

2. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。下痢
3. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

C112