

肌あれ・にきび・口内炎に

販売名

マスチゲンBBチュアブル錠

水なしでポリポリとかんで服用

ビタミンC・ビタミンB₂・ビタミンB₆配合の、肌あれ・にきび・口内炎に効く、水なしでポリポリとかんで服用する医薬品のチュアブル錠です。

特長

1. チュアブル錠は、水なしでポリポリとかんで服用できますので、職場や学校で手軽に症状の改善効果を得られます。
2. お肌の真皮層を形成するコラーゲンづくりを助けるビタミンC配合により肌あれを内側から治します。
3. 皮膚を正常な状態にもどすビタミンB₂配合により、ポツポツと赤くはれたニキビを体の中から治します。
4. ビタミンB₆の働きで、しみると痛い口内炎を改善します。
5. 疲れの栄養補給に効果的です。
6. 低カロリー・甘さひかえめ。
7. 外出時に携帯しやすい6錠入シート包装。

効能・効果 次の諸症状の緩和：肌あれ、にきび、吹き出物、口内炎、湿疹、口角炎(唇の両端の腫れ・ひび割れ)、皮膚炎、口唇炎(唇の腫れ・ひび割れ)、かぶれ、ただれ、赤ら顔に伴う



マンゴー味

第3類医薬品

12錠入

服用は1日1回

唇のほてり、舌の炎症、目の充血、目のかゆみ

「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談すること。」

次の場合のビタミンB₂の補給：内痔瘻、痔、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

用法・用量 7歳以上15歳未満 1日1回1錠、15歳以上1日1回2錠をそのままかむか、口の中で溶かして服用して下さい。朝・昼・晩いつ服用してもかまいません。水と一緒に服用することもできます。

注意 用法用量に開通する注意 1. 本剤の使用により、錠が茶色くなることがありますが、配合されているビタミンB₂の一部が錠中に溶出されるため心配はありません。2. 定められた用法・用量を守り下さい。3. かむか、口の中で溶かして服用して下さい。4. 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。5. 図のようにシート包装の中心部を指先で押して錠を取り出して服用して下さい。誤ってシート包装のすまみ部から取り出すと錠が破れ、口内炎に突き刺さる等の恐れがありますのでご注意ください。



使用期限
製造番号



日本機器製薬
大塚製薬株式会社
〒100-8385 東京都千代田区千代田1-3-1
大塚製薬ビル
TEL 03-5221-0411
FAX 03-5221-0412
E-MAIL info@otsuma.co.jp
© 2012 大塚製薬株式会社

成分 (6錠相当量)

ビタミンC(無水L-アスコルビン酸) 20mg
ビタミンB₂ 500μg
ビタミンB₆ 500μg
その他としてトコフェロール(α-トコフェロール)、カルシウムD-パンテート、結晶セルロース、ステアリン酸、ポリビニルピロリドン、ヒドロキシプロピルセルロース、糖粉、香料、バニリンを添加します。

開け口

第3類医薬品

肌あれ・にきび・口内炎に

マスチゲン®
BBチュアブル錠




実物大

ビタミンC・B₂・B₆配合

水なしでポリポリとかんで服用

服用は1日1回

12錠入



マンゴー味

副作用 副作用として、まれにアレルギー反応(かぶれ、かゆみ、発疹、じんましん、顔面浮腫、呼吸困難、血圧低下、意識障害、アナフィラキシーショック)が報告されています。この場合は服用を中止し、医師に相談して下さい。

禁忌 次の症状がある場合は服用を中止し、医師に相談して下さい。

1. 服用中、次の症状があらわれた場合は服用を中止し、医師に相談して下さい。
2. 服用中、次の症状があらわれた場合は服用を中止し、医師に相談して下さい。
3. 服用中、次の症状があらわれた場合は服用を中止し、医師に相談して下さい。
4. 服用中、次の症状があらわれた場合は服用を中止し、医師に相談して下さい。

注意 次の症状がある場合は服用を中止し、医師に相談して下さい。

1. 服用中、次の症状があらわれた場合は服用を中止し、医師に相談して下さい。
2. 服用中、次の症状があらわれた場合は服用を中止し、医師に相談して下さい。
3. 服用中、次の症状があらわれた場合は服用を中止し、医師に相談して下さい。
4. 服用中、次の症状があらわれた場合は服用を中止し、医師に相談して下さい。