

有効成分そのまま！
飲みやすくなりました
1包あたり 3g→1g

第2類医薬品

ま　　お　　う　　と　　う

麻　黄　湯

顆粒
42包

満量
処方

第2類医薬品

感冒、鼻かぜ、気管支炎、鼻づまり

ま　　お　　う　　と　　う

麻　黄　湯

顆粒
42包

満量
処方

眠くなる成分は入っていません

体力充実して、かぜのひきはじめて、さむけがして発熱、頭痛があり、せきが出て身体のふしぶしが痛く汗が出ていないものの次の諸症
感冒、鼻かぜ、気管支炎、鼻づまり

第2類医薬品

かぜのひきはじめて、さむけがする方の
ふしぶしの痛み

頭痛・発熱

ま　　お　　う　　と　　う

麻　黄　湯　顆　粒

満量
処方

顆粒
42包

眠くなる成分は入っていません

体力充実して、かぜのひきはじめて、さむけがして発熱、頭痛があり、せきが出て身体のふしぶしが痛く汗が出ていないものの次の諸症
感冒、鼻かぜ、気管支炎、鼻づまり

【効能・効果】
体力充実して、かぜのひきはじめて、さむけがして発熱、頭痛があり、せきが出て身体のふしぶしが痛く汗が出ていないものの次の諸症：感冒、鼻かぜ、気管支炎、鼻づまり

【用法・用量】
1日3回食前又は食間に水かお湯で服用してください。

年　　齢	1回量	服用回数
成人（15歳以上）	1　包	1日3回
7歳以上　15歳未満	2／3　包	
4歳以上　　7歳未満	1／2　包	
4歳未満	服用しないでください	

※食間とは食後2～3時間を指します。

<用法・用量に関連する注意>
(1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
(2) 定められた用法・用量を厳守してください。

【成分・分量】
成人1日量3包(1包1.0g)中　日局 麻黄湯エキス 1.92g

成　分	分量	成　分	分量
日局 マオウ	5　g	日局 ケイヒ	4　g
日局 キョウニン	5　g	日局 カンゾウ	1.5 g

より製した乾燥エキス
添加物：乳糖水和物、結晶セルロース、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム

<成分・分量に関連する注意>
本剤は天然物(生薬)のエキスをを用いていますので、顆粒の色調等が多少異なることがあります。

【保管及び取扱い上の注意】
(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
(2) 小児の手の届かない所に保管してください。
(3) 他の容器に入れ替えないでください。
（誤用の原因になったり品質が変わります。）
(4) 湿気などにより薬が固化することがありますので、1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、速やかに服用してください。
(5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

【お客様相談室】 ☎ 06-6423-0565
(祝日を除く月～金曜日10:00～17:00)

【製造販売元】
株式会社 阪本漢法製薬
兵庫県尼崎市名神町1-5-12
副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

押して開ける

漢方製剤

第2類医薬品

服用前にこの箱の説明書を必ずお読みください。また、添付文書は挿入して
おりませんので、必要なときに読めるよう、この箱を大切に保管してください。

【販売名】サカンボー麻黄湯顆粒

【特　　徴】
○「麻黄湯」は、体力が充実して、かぜのひきはじめて、頭痛やせきがあり、汗が出ていない方のふしぶしの痛み、発熱、さむけのある感冒などの症状を改善するための処方です。
○本剤は「麻黄湯」の1日最大量の生薬より抽出したエキスを配合した満量処方で、飲みやすく服用量を調節しやすい顆粒です。
○本剤は眠くなる成分を含みませんので、仕事や車の運転にも支障はありません。

△使用上の注意△

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
1. 次の人は服用しないでください
　　体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）
2. 短期間の服用にとどめ、連用しないでください

🗨️ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
(3) 胃腸の弱い人
(4) 発汗傾向の著しい人
(5) 高齢者
(6) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
(7) 次の症状のある人：むくみ、排尿困難
(8) 次の診断を受けた人：高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症　　状
皮　　膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、食欲不振、胃部不快感
その他	発汗過多、全身脱力感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症　　状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこばばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

3. 1ヵ月位（感冒、鼻かぜに服用する場合には5～6回）服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

セルフメディケーション
税 控 除 対 象

4 987076 627569

袋：PE、金属
紙 箱

製造番号

使用期限

S3