

有効成分そのまま！
飲みやすくなりました
1包あたり 3g→2g

第2類医薬品

しょうせいりゅうとう

小青竜湯

顆粒
42包

満量処方

第2類医薬品

しょうせいりゅうとう

小青竜湯

顆粒
42包

満量処方

第2類医薬品

しょうせいりゅうとう

小青竜湯顆粒

満量処方

うすい水様のたんを伴うせきや鼻水が出る方の

鼻炎・花粉症

むくみ

顆粒
42包

眠くなる成分は入っていません

体力中等度又はやや虚弱で、うすい水様のたんを伴うせきや鼻水が出るものの次の諸症
鼻炎、アレルギー性鼻炎、花粉症、感冒、気管支炎、むくみ

眠くなる成分は入っていません

体力中等度又はやや虚弱で、うすい水様のたんを伴うせきや鼻水が出るものの次の諸症
鼻炎、アレルギー性鼻炎、花粉症、感冒、気管支炎、むくみ

【用法・用量】
1日3回食前又は食間に服用してください。

年 齢	1回量	服用回数
成人（15歳以上）	1包	1日3回
7歳以上 15歳未満	2／3包	
4歳以上 7歳未満	1／2包	
2歳以上 4歳未満	1／3包	
2歳未満	1／4包	

※食間とは食後2～3時間を指します。
※水かお湯で服用してください。

<用法・用量に関連する注意>
(1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
(2)1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合にのみ服用させてください。
(3)定められた用法・用量を厳守してください。

【成分・分量】
成人1日量3包(1包2.0g)中 日局 小青竜湯エキス 4.22g

成 分	分量	成 分	分量
日局 マオウ	3g	日局 ケイヒ	3g
日局 シャクヤク	3g	日局 サイシン	3g
日局 カンキョウ	3g	日局 ゴミシ	3g
日局 カンゾウ	3g	日局 ハンゲ	6g

より製した乾燥エキス
添加物：乳糖水和物、結晶セルロース、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム

<成分・分量に関連する注意>
本剤は天然物(生薬)のエキスをを用いていますので、顆粒の色調等が多少異なることがあります。

【保管及び取扱い上の注意】
(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
(2)小児の手の届かない所に保管してください。
(3)他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
(4)湿気などにより薬が固化することがありますので、1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、速やかに服用してください。
(5)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

【お客様相談室】 ☎ 06-6423-0565
(祝日を除く月～金曜日10:00～17:00)

【製造販売元】
株式会社 阪本漢法製薬
兵庫県尼崎市名神町1-5-12

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

漢方製剤

第2類医薬品

押して開ける

服用前にこの箱の説明文書を必ずお読みください。また、添付文書は挿入して
おりませんので、必要なときに読めるよう、この箱を大切に保管してください。

【販売名】サカンポー小青竜湯顆粒

【特 徴】
○「小青竜湯」は、体力が中等度又はやや虚弱で、うすい水様のたんを伴うせきや鼻水が出る方の鼻炎、アレルギー性鼻炎、花粉症、感冒などの症状を改善するための処方です。
○本剤は「小青竜湯」の1日最大量の生薬より抽出したエキスを配合した満量処方で、飲みやすく服用量を調節しやすい顆粒です。
○本剤は眠くなる成分を含みませんので、仕事や車の運転にも支障はありません。

△ 使用上の注意 △
☒ **してはいけないこと**
(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
次の人は服用しないでください 生後3ヵ月未満の乳児
☒ **相談すること**
1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1)医師の治療を受けている人 (7)今までに薬などにより発疹・発赤、
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人 かゆみ等を起こしたことがある人
(3)体の虚弱な人 (8)次の症状のある人
(体力の衰えている人、体の弱い人) むくみ、排尿困難
(4)胃腸の弱い人 (9)次の診断を受けた人
(5)発汗傾向の著しい人 高血圧、心臓病、腎臓病、
(6)高齢者 甲状腺機能障害
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 1ヵ月位(感冒に服用する場合には5～6日間)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】体力中等度又はやや虚弱で、うすい水様のたんを伴うせきや鼻水が出るものの次の諸症：気管支炎、気管支ぜんそく、鼻炎、アレルギー性鼻炎、むくみ、感冒、花粉症

セルフメディケーション
税 控 除 対 象

4 987076 626456

袋：PE、金属
紙 箱

製造番号

使用期限

S4