

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

鎮痛消炎薬

第2類医薬品

ロキプロフィンLXローション

製品の特長

ロキプロフィンLXローションは、ロキソプロフェンナトリウム水和物を配合し、すぐれた鎮痛消炎効果を発揮します。

べたつきが少なく、乾きが早いローション剤です。

⚠️ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください。
 - (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (2) 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、外用鎮痛消炎薬を使用してぜんそくを起こしたことがある人
 - (3) 15歳未満の小児
2. 次の部位には使用しないでください。
 - (1) 目の周囲、粘膜等
 - (2) 皮膚の弱い部位 (顔、わきの下等)
 - (3) しっしん、かぶれ、傷口
 - (4) みずむし・たむし等又は化膿している患部
3. 本剤を使用している間は、他の外用鎮痛消炎薬を使用しないでください。
4. 連続して2週間以上使用しないでください。
(本剤は痛みを一時的におさえるものです。痛み等の症状が継続する場合には、使用を中止し、医師の診療を受けてください)



■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の診療を受けている人
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (3) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (4) 高齢者
 - (5) 次の診断を受けた人
気管支ぜんそく
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

| 関係部位 | 症 状 |
|------|--------------------------------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、かぶれ、水疱、色素沈着 |
| 消化器 | 胃部不快感、みぞおちの痛み |
| その他 | むくみ |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称 | 症 状 |
|--------------------|---|
| ショック (アナフィラキシー) | 使用后すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。 |

3. 使用后、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
下痢・軟便
4. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。(他の疾患の可能性あります)

(必ず裏面もお読みください)

【効能・効果】

腰痛、肩こりに伴う肩の痛み、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎（手・手首の痛み）、肘の痛み（テニス肘など）、打撲、捻挫

【用法・用量】

1日3～4回、適量を患部に塗布してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)使用部位をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないでください。
- (3)本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤なので、症状がある場合だけ使用してください。
- (4)塗布部を肌に数回押し当て、スポンジ部に薬液を十分しみこませてから使用してください。
- (5)1回あたり約2g*、1週間あたり50gを超えて使用しないでください。
（※スポンジ部を患部に押し当てたまま、約20cmスライドさせると約0.3gの薬液が出ます。これを6～7回繰り返すと、約2gの使用量となりますので目安としてください。）
- (6)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (7)外用にのみ使用してください。

【成分・分量】 100g中

| 成分 | 分量 |
|------------------|-----------------|
| ロキソプロフェンナトリウム水和物 | 1.13g（無水物として1g） |

添加物：ヒプロメロース、クエン酸水和物、クエン酸ナトリウム水和物、香料、エタノール、精製水

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります）
- (4)火気に近づけないでください。
- (5)メガネ、時計、アクセサリ等の金属類、アルコール類や油脂類等で変質・変色のおそれのあるもの（プラスチック製品、化学繊維、皮革、家具、床等）への本剤の付着は避けてください。
- (6)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。使用期限内であっても、品質保持の点から開封後はなるべく早く使用してください。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願いいたします。

新生薬品株式会社 消費者相談窓口

〒930-0364 富山県中新川郡上市町横越16番1

電話番号(076)472-0361

受付時間 9:00～17:00（土、日、祝日を除く）

発売元 **株式会社大石膏盛堂**
佐賀県鳥栖市本町1丁目933番地

製造販売元 **新生薬品株式会社**
富山県中新川郡上市町横越16番1