

C504

開封年月日

年 月 日

レーシステイン配合製剤
販売名：キミエホワイトプラス

第3類医薬品

【保管及び取り扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 容器の中の詰め物は、フタを開けた後は取り除いてください。
(詰め物は、錠剤が輸送中に破損するのを防止するためのものです。)
- (5) 服用の都度、容器のフタをしっかりと閉めてください。
(吸湿し品質が変わることがあります。)
- (6) 使用期限の過ぎた製品は服用しないでください。
- (7) 箱の「開封年月日」記入欄に、開封した日付を記入してください。



お問い合わせ 株式会社富山常備薬
☎ 0120-432-093
受付時間：9時～18時（年中無休）

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

製造販売元 五洲薬品株式会社
富山県富山市花園町 1-1-5
発売元 株式会社富山常備薬
富山県富山市丸の内1-8-17

®登録商標

AS1214210928

第3類医薬品

KIMIE WHITE PLUS
キミエホワイト®
PLUS プラス

レーシステイン・アスコルビン酸（ビタミンC）
パントテン酸カルシウム（ビタミンB5）

第3類医薬品

顔・背中・腕 しみ
そばかすに
飲んで効く

KIMIE WHITE PLUS 31日分 93錠
キミエホワイト®
PLUS プラス

有効成分 レーシステイン
アスコルビン酸（ビタミンC）
パントテン酸カルシウム（ビタミンB5）

富山常備薬

使用期限

製造番号

紙：箱

ラ：詰め物



4 580544 060068

服用前に、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう本剤とともに大切に保管してください。

⚠ 使用上の注意

■ 相談すること

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
消化器	吐き気・嘔吐、腹痛
皮膚	発 疹

2. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
下痢
3. しばらく服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。