

L-システイン
アスコルピン酸(ビタミンC)
パントテン酸カルシウム(ビタミンB5)

有効成分

しみ・そばかすに 飲んで効く

キミエホワイトプラス

31日分 93錠
キミエホワイトプラス
KIMIE WHITE PLUS
第3類医薬品

この線の上をお切りください

▲この線の上をお切りください
開封後はチャックをしっかり閉じて保管してください

服用前に、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう本剤とともに大切に保管してください。

L-システイン配合製剤 第3類医薬品

販売名：キミエホワイトプラス

【成分・分量】1日量(3錠)中

アスコルピン酸……………500mg
L-システイン……………240mg
パントテン酸カルシウム……………24mg

添加物として、乳酸Ca水和物、セルロース、無水ケイ酸、トウモロコシデンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、タルク、ステアリン酸Mg、ポリビニルアルコール・アクリル酸・メタクリル酸メチル共重合体、ヒプロメロース、酸化チタン及びカルナウバロウを含有する。

【成分・分量に関連する注意】

●ビタミンCの服用により、尿および大便の検査値に影響を及ぼすことがありますので、尿および大便の検査を受ける場合には、本剤を服用していることを医師にお知らせしてください。

【効能・効果】

しみ・そばかす・日焼けなどの色素沈着症、にきび、湿疹、じんましん、かぶれ、くすりまけ、全身倦怠、二日酔

【用法・用量】

次の量を食後服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1錠	3回
15歳未満	服用しないでください	

【保管及び取り扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所にチャックを閉じて保管してください。
- 小見の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- 服用の都度、チャックをしっかり閉じてください。(吸湿し品質が変わることがあります。)
- 使用期限の過ぎた製品は服用しないでください。
- 袋の中に乾燥剤が入っています。服用しないでください。

使用期限 製造番号

▲使用上の注意

相談すること

1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
消化器	吐き気・嘔吐、腹痛
皮膚	発疹

2.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
下痢

3.しばらく服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

お問い合わせ 株式会社富山常備薬

☎0120-432-093

受付時間：9時～18時(年中無休)

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

製造販売元 発売元
五洲薬品株式会社 株式会社富山常備薬
富山県富山市花園町1-1-5 富山県富山市丸の内1-8-17

PE, PET,M ®登録商標 OS4200230216



4 580544 060860