

第②類医薬品

チシト
HR液

3つの作用で

がまんできない症状
を抑えます。



消炎作用

かゆみ止め
作用

殺菌作用

抗炎症成分
PVA
配合

製造販売元
協和薬品工業株式会社
岐阜県岐阜市野一色二丁目8番6号
副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

本剤について、何かお気づきの点がございましたら、お問い合わせのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。
消費者相談窓口：協和薬品工業株式会社 お客様相談室
☎058-246-8771
受付時間：9:00～12:00・13:00～17:00（土、日、祝日を除く）

開封口

めりやすい
液剤タイプ

テシトン
HR液

3つの
作用で

がまんできない症状
を抑えます。

消炎作用

かゆみ止め
作用

殺菌作用

第②類医薬品

汗などによるかゆみ、しっしん、かぶれに効く

成分・分量（100mL中）
プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル（PVA）..... 0.15g
ジフェニヒドラミン塩酸塩..... 1.0g
L-メントール..... 3.5g
dl-カンフル..... 1.0g
イソプロピルメチルフェノール 0.1g
添加物として、ジブチルヒドロキシトルエン、1,3-ブチレンジグリコール、エタノールを含有します。

保管及び取り扱い上の注意

（1）直射日光の当たらない涼しい所に密栓して立てて保管してください。（2）小児の手の届かない所に保管してください。（3）他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります）（4）火気に近づけないでください。また、使用後は火中に投じないでください。（5）メガネ、時計、アクセサリー、プラスチック類、化粧品、皮革製品、床や家具などの塗装面等に付着すると変質することがありますので、付着しないように注意してください。（6）使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。また、開封後は使用期限内であっても、なるべく速やかに使用してください。

【容量】40mL

火気厳禁
第二石油類、危険等級Ⅲ
（エタノール）

紙箱

セルフメディケーション
税控除対象



A2106

1

●省資源化のため、ケースが添付文書を兼ねています。ご使用に際して、このケースの記載内容を必ず読んでください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

販売名 テシトンHR液

△使用上の注意

❌ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）

1. 次の部位には使用しないでください
（1）水痘（水ぼうそう）、みずむし・たむし等又は化膿している患部。
（2）創傷面、目の周囲、粘膜等。
2. 顔面には、広範囲に使用しないでください
3. 長期連用しないでください

🗨️ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
（1）医師の治療を受けている人。
（2）妊婦又は妊娠していると思われる人。
（3）薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
（4）患部が広範囲の人。
（5）湿潤やただれのひどい人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、このケースを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
皮膚（患部）	みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、このケースを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果 湿疹、皮膚炎、あせも、かぶれ、かゆみ、虫さされ、じんましん

用法・用量 1日数回、適量を患部に塗布してください。

用法・用量に関連する注意

（1）キャップをとりはずし、スポンジ部分を肌に数回軽く押し当てて、スポンジに薬液をしみ込ませてから使用してください。薬液がスポンジ面に十分しみ込んでいないと、スポンジ面が破損するおそれがあります。使用後は、スポンジの乾燥を防ぐため、必ずキャップをしっかりと閉めてください。（2）定められた用法・用量を守ってください。（3）小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。（4）目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。（5）外用にのみ使用してください。

セルフメディケーション

税控除対象

鎮痒消炎薬

がまんできない

液
40mL

あせも
かぶれ

首もと

皮膚患部で
よく効き
体内では低活性

ひじの内側

使用期限
製造番号