

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

鎮痒消炎薬

第3類医薬品

# 液体ミリミベビー

## 液体ミリミベビーの特徴

- かゆみ止め成分の「ジフェンヒドラミン塩酸塩」のほか、お肌そのものの修復力を高める作用のある「パンテノール」、炎症を抑える作用のある「グリチルリチン酸二カリウム」、殺菌作用のある「ベンゼトニウム塩化物」を配合しています。
- アルコールやメントールを配合していない刺激感の少ない処方ですので、お子様等のデリケートなお肌にご使用いただけます。
- 健康なお肌と同じ弱酸性です。
- 無香料・無着色です。
- ステロイド成分は配合していません。



## 使用上の注意



### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
(1) 医師の治療を受けている人。  
(2) 薬などによりアレルギー症状（発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等）を起こしたことがある人。  
(3) 湿潤やただれのひどい人。
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ、はれ

3. 5~6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

(必ず裏面もお読みください)

## 【効能・効果】


かゆみ、虫さされ、あせも、かぶれ、しっしん、じんましん、皮膚炎、しもやけ、ただれ

## 【用法・用量】

1日数回、適量を患部に塗布してください。

### 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。なお、本剤の使用開始目安年齢は生後3カ月以上です。
- (2) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (3) 本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。
  - ・患部が汚れている場合には、水又はぬるま湯で軽くふき、清潔にしてから塗布してください。



### 【容器の使い方】

- ① スポンジの面を患部にゆっくり押し当て、スポンジ全体に薬液をしみ込ませてください。
- ② 薬液がスポンジに十分にしみ込んだことを確認した後、患部にやさしく塗布してください。  
(薬液がスポンジに十分しみ込んでいないと、スポンジが破れ、容器で皮膚を傷つけるおそれがあります。)
- ③ 使用後はスポンジの乾燥を防ぐため、必ずキャップをしっかり閉めてください。

## 【成分・分量】(100g中)

成分	分量	はたらき
ジフェンヒドラミン塩酸塩	2.0g	かゆみを抑えます
パンテノール	1.0g	お肌のものの修復力を高めます
グリチルリチン酸二カリウム	0.2g	炎症を抑えます
ベンゼトニウム塩化物	0.05g	殺菌作用があります

添加物としてグリセリンを含有します。

## 【保管及び取扱い上の注意】



- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。使用期限内であっても、品質保持の点から開封後はなるべく早く使用してください。

お子様が誤って液体ミリメビーを口に入れてしまった場合

少量なめた程度では影響はありませんが、量が多いと眠気があらわれることがあります。大量に(目安として5mL以上)飲み込んだときや、めまい、はきけ、倦怠感(だるさ)、呼吸異常などの症状がある場合には医師の診療を受けてください。

製品のお問い合わせ先  
新生薬品株式会社 消費者相談窓口  
電話: 076-472-0361  
受付時間: 9時~17時(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先  
(独)医薬品医療機器総合機構  
[http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai\\_camp/index.html](http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html)  
☎0120-149-931(フリーダイヤル)

製造販売元 **新生薬品株式会社**  
富山県中新川郡上市町横越16番1