

第2類医薬品

八味地黄丸料錠OM

開封口

漢方薬

▲ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の人は服用しないこと。

(1) 胃腸の弱い人。(2) 下痢しやすい人。

🗨️ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

(1) 医師の治療を受けている人。

(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。

(3) のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人。

(4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感、腹痛
その他	動悸、のぼせ、口唇・舌のしびれ

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
下痢

4. 1ヵ月位服用しても症状がよくなりな場合は服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

第2類医薬品

八味地黄丸料錠OM

【成分及び分量】 1日量(9錠)中

ジオウ…2.5g ブクリョウ…1.5g
サンシュユ…1.5g ボタンビ…1.5g
サンヤク…1.5g ケイヒ…0.5g
タクシャ…1.5g ブシ末…0.5g
上記生薬より得た八味地黄丸料エキス(1/2量)2200mgを含む。

添加物として、CMC-Ca、二酸化ケイ素、クロスCMC-Na、タルク、ステアリン酸Mg、セルロース、ヒプロメロース、マクロゴール、カルナウバロウを含む。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

お問い合わせ先

製造販売元 大峰堂薬品工業株式会社
奈良県大和高田市根成柿574

消費者相談窓口 電話 0745-22-3601
受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 電話 0120-149-931

漢方薬

第2類医薬品

八味地黄丸料錠OM

【効能又は効果】

体力中等度以下で、疲れやすく、四肢が冷えやすく、尿量減少又は多尿で、ときに口渇があるものの次の諸症：

下肢痛、腰痛、しびれ、高齢者のかすみ目、かゆみ、排尿困難、残尿感、夜間尿、頻尿、むくみ、高血圧に伴う随伴症状の改善(肩こり、頭重、耳鳴り)、軽い尿漏れ

【用法及び用量】

次の量を食前又は食間に、水又は白湯にて服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	3錠	3回
15歳未満5歳以上	2錠	
5歳未満	服用しないこと	

【用法・用量に関連する注意】

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。



八味地黄丸料

エキス剤 270錠

大峰堂薬品工業株式会社



副産物

各量取

I-SV