

販売名：エプールH軟膏EX

〈外用痔疾用薬〉

第②類医薬品

効能・効果

きれ痔(さけ痔)・いぼ痔の痛み・かゆみ・はれ・出血の緩和及び消毒

用法・用量

1日1～3回、適量を肛門部に塗布してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2)肛門部にのみ使用してください。

成分・分量(100g中)

ヒドロコルチゾン酢酸エステル.....0.5g  
リドカイン.....3.0g  
酸化亜鉛.....4.0g  
イソプロピルメチルフェノール.....0.1g  
クロルフェニラミンマレイン酸塩.....0.2g  
アラントイン.....1.0g  
グリチルレチン酸.....0.3g  
トコフェロール酢酸エステル.....3.0g  
添加物として、マクロゴール、中鎖脂肪酸トリグリセリド、モノステアリン酸グリセリン、ソルビタンセスキオレイン酸エステル、ワセリンを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わります。)

省資源化のため箱が説明書を兼ねています。ご使用に際して、この箱の説明を必ず読んでください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

- 1.次の人は使用しないでください  
患部が化膿している人。
- 2.長期連用しないでください

🗨 相談すること

- 1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
(1)医師の治療を受けている人。  
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。  
(3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

| 関係部位 | 症 状          |
|------|--------------|
| 皮膚   | 発疹・発赤、かゆみ、はれ |
| その他  | 刺激感、化膿       |

- 3.10日間くらい使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

製造販売元

万協製薬株式会社

三重県多気郡多気町五桂1169-142

万協製薬株式会社

「お客様相談室」

電話 0598-30-5376

受付時間 10:00～17:00

(ただし、土、日、祝日は除きます。)