

開封口

省資源化のため、箱が添付文書を兼ねています。
ご使用に際して、この箱の記載内容を必ず読んでください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

△ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください。

- (1) 出血性血液疾患(血友病、血小板減少症、紫斑病など)の人。
- (2) わずかな出血でも重大な結果をきたすことが予想される人。(血液凝固抑制作用を有し出血を助長するおそれがあります)

2. 次の部位には使用しないでください。
目、粘膜(口腔、鼻腔、膣など)

📞 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(3) 潤滑やただれのひどい人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、紫斑

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

第2類医薬品

販売名：ヘパロイド乳液 α
(外用薬)

【成分・分量】(100g中)

ヘパリン類似物質……………0.3g
アラントイン……………0.2g
トコフェロール酢酸エステル…0.5g
添加物：プロピレングリコール、dl-ピロリジンカルボン酸Na、ミリスチン酸イソプロピル、セトステアリルアルコール、ポリソルベート60、ポリオキシエチレンベヘニルエーテル、パラベン、エデト酸Na、ジブチルヒドロキシトエン、pH調節剤、ヒアルロン酸Na

【効能・効果】

手指の荒れ、ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、手足のひび・あかぎれ、乾皮膚、小児の乾燥性皮膚、しもやけ(ただれを除く)、きず・やけどのあとの皮膚のしこり・つっぱり(顔面を除く)、打身・ねんご後のはれ・筋肉痛・関節痛

製造販売元

万協製薬株式会社
三重県多気郡多気町五柱 1169-142

万協製薬株式会社「お客様相談室」
電話 0598-30-5376
受付時間 10:00～17:00
(ただし、土、日、祝日は除きます。)

副作用被害救済制度 ☎ 0120(149)931

内容量：50g
MADE IN JAPAN



くり返す乾燥肌に!

ヘパロイド 乳液α

ヘパリン類似物質配合

第2類医薬品

50g

くり返す乾燥肌に!

ヘパロイド

乳液α

ヘパリン類似物質

保湿、抗炎症、血行促進成分

ビタミンE

血行促進成分

アラントイン

肌修復促進成分

ヘパロイド

乳液α

Heparoid

MILKY LOTION

ヘパリン類似物質配合

第2類医薬品 50g

50g

第2類医薬品

【用法・用量】

1日1～数回、適量を患部にすりこむか、又はガーゼ等のにぼして貼ってください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 定められた用法・用量を守ってください。
- (2) 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (3) 外用にのみ使用してください。※出血のある傷口には使用しないでください。(血が止まりにくくなる場合があります)※顔面にある傷あと、やけどのあとには使用しないでください。
- (4) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 本剤のついた手で、目などの粘膜に触れないでください。
- (2) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (3) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (4) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後は品質保持の点からなるべく早く使用してください。

B2410



4 535653 001525

上段：使用期限、下段：製造番号

1
300W