

使用前にこの説明文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

# バンテキュアパップID

第2類医薬品 **インドメタシン 0.7% 配合** **28枚入**  
(7枚入×4袋)

## 【特長】

- 肩・腰・関節などの痛みにすぐれた効果を発揮する鎮痛・消炎シブ薬です。
- インドメタシンが患部に直接浸透し、痛みの原因プロスタグランジンの発生を抑えます。
- 伸縮性に富んだ不織布を使用しているため、すぐれたフィット感が得られます。

## ⚠【使用上の注意】

**してはいけないこと** [守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります]

- 次の人は使用しないで下さい。  
(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(2) ぜんそくを起こしたことがある人。  
(3) 15歳未満の小児。
- 次の部位には使用しないで下さい。  
(1) 目の周囲、粘膜等。(2) 湿疹、かぶれ、傷口。(3) みずむしたむし等又は化膿している患部。
- 長期連用しないで下さい。

 **相談すること**

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。  
(1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。  
(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、はれ、かゆみ、ヒリヒリ感、熱感、乾燥感

- 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

## 【効能・効果】

関節痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘等)、筋肉痛、腰痛、打撲、捻挫、肩こりに伴う肩の痛み

## 【用法・用量】

プラスチックフィルムをはがし、1日2回を限度として患部に貼付して下さい。

お問い合わせ先:株式会社タカミツ  
フリーダイヤル 0120-459533/受付時間 [月～金曜日 9:00～17:00 祝日を除く]

## 【用法・用量に関する注意】

(1) 定められた用法・用量を守って下さい。(2) 本剤は、痛みやはれ等の原因となっている病気を治療するのではなく痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤なので、症状がある場合だけ使用して下さい。(3) 汗をかいていたたり、患部がぬれていたりする時は、よく拭き取ってから使用して下さい。(4) 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用して下さい。(5) 連続して2週間以上使用しないで下さい。

## 【成分・分量】(膏体100g中)

インドメタシン……………0.7g  
添加物:カルボキシビニルポリマー、ポリビニルアルコール、D-ソルビトール、L-メントール、ポリソルベート80、ヒマシ油、エデト酸Na水和物、ジヒドロキシアルミニウムアミノアセテート、ピロ亜硫酸Na、酸化チタン、カオリン、グリセリン、CMC-Na、ポリアクリル酸部分中和物、マクロゴール、酒石酸、香料

## 【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。[誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。]
- (4) 使用期限を過ぎたものは使用しないで下さい。
- (5) 開封後は、未使用分を袋に戻しチャックを閉じて保管して下さい。また、品質保持の点からなるべく早くご使用下さい。

【包装】 28枚入(7枚入×4袋 1枚:10cm×14cm)

製造販売元 **株式会社タカミツ**  
〒462-0803 名古屋市長区上飯田東町4の68の1



副作用被害救済制度の問い合わせ先  
(独) 医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/>  
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)



4 987487 104123

製造番号

使用期限