

**【成分・分量】** 1日量(50mL)中  
 ゴオウチンキ……………200 $\mu$ L  
 (原生薬換算量 2mg)  
 ニンジンエキス……………55mg  
 (原生薬換算量 611mg)  
 ロクジョウチンキ……………50 $\mu$ L  
 (原生薬換算量 15mg)  
 オウセイ流エキス……………240 $\mu$ L  
 (原生薬換算量 240mg)  
 インヨウカクエキス……………50mg  
 (原生薬換算量 500mg)  
 タウリン……………1,000mg  
 チアミン塩化物塩酸塩…10mg  
 (ビタミンB<sub>1</sub>)  
 リポフラビン(ビタミンB<sub>2</sub>)…2mg  
 ピリドキシン塩酸塩……………20mg  
 (ビタミンB<sub>6</sub>)  
 ニコチン酸アミド……………20mg  
 無水カフェイン……………50mg  
 添加物としてクエン酸、クエン酸  
 Na、塩化Na、DL-リンゴ酸、ブドウ  
 糖果糖液糖、白糖、D-ソルビトール、  
 安息香酸Na、香料、カラメル  
 を含有。(アルコール0.5mL以下)

副作用被害救済制度

☎ 0120-149-931

発売元  
 協和薬品工業株式会社  
 岐阜県岐阜市野一色二丁目8番6号  
 お客様相談室 ☎058-246-8771

製造販売元  
 萬金薬品工業株式会社  
 奈良県高市郡明日香村野口317番地

**パトリオン  
 ゴールドII**

医薬品

滋養強壮・肉体疲労  
 栄養補給に

ロクジョウ・ゴオウ・ニンジン・  
 オウセイ・タウリン・インヨウカク・  
 ビタミンB<sub>1</sub>・B<sub>2</sub>・B<sub>6</sub>・ニコチン酸アミド

第2類医薬品

50mL

**【販売名】**パトリオンゴールドII

**【使用上の注意】**相談すること

(1)服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

●皮膚：発疹／消化器：胃部不快感、下痢  
 (2)次の場合は、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
 ●しばらく服用しても症状がよくならない場合

**【効能・効果】**

滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病中病後・胃腸障害・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

**【用法・用量】**

成人(15歳以上)1日1回1本(50mL)を服用する。

●用法・用量を厳守してください。

**【保管及び取扱い上の注意】**

- 1.直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 2.小児の手の届かない所に保管してください。
- 3.使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- 4.本剤は生薬を配合していますので、まれに沈殿を生じることがありますが、薬効には変わりありませんので、よく振ってから服用してください。

使用  
 期限

製造  
 番号