

この説明書は、ご使用前に必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

のどが渇き尿量が少ない方の頭痛やむくみに

これいさん

DHC 漢方 五苓散エキス錠

<一般用漢方製剤>

第2類医薬品

DHC漢方五苓散エキス錠は、中国の古典医学書「傷寒論」^{しょうかんろん}「金匱要略」^{きんぎやうりやく}に記載されている五苓散のエキスを服用しやすい錠剤にした漢方薬です。のどが渇き尿量が少ない方のめまいや頭痛、むくみを伴う水様性下痢や急性胃腸炎、二日酔いに効果があります。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 1ヵ月位(急性胃腸炎、二日酔いに服用する場合には5～6回、水様性下痢、暑気あたりに服用する場合には5～6日間)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

■ 効能・効果

体力に関わらず使用でき、のどが渇いて尿量が少ないもので、めまい、はきけ、嘔吐、腹痛、頭痛、むくみなどのいずれかを伴う次の諸症：

水様性下痢、急性胃腸炎(しぶり腹のものには使用しないこと)、暑気あたり、頭痛、むくみ、二日酔

【効能・効果に関連する注意】

しぶり腹とは、残便感があり、くり返し腹痛を伴う便意を催すものことである。

■ 用法・用量

次の量を食間に水又は白湯にて服用してください。

年齢	1回量	服用回数
成人(15才以上)	6錠	1日3回
7才以上15才未満	4錠	
5才以上7才未満	3錠	
5才未満	服用しないこと	

【用法・用量に関連する注意】

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

■ 成分・分量

18錠(成人1日量)中

下記の成分及び分量からなる五苓散エキス(1/2量)800mgを含有します。

成分	分量
ケイヒ	1.5g
タクシャ	3.0g
チヨレイ	2.25g
ビャクジュツ	2.25g
ブクリョウ	2.25g

添加物として、カルメロースCa、無水ケイ酸、ステアリン酸Mg、デキストリン、トウモロコシデンプンを含有します。

【成分に関連する注意】

本剤は生薬を用いていますので、錠剤の色調が異なることがあります。

■ 保管及び取扱い上の注意

- 1.直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- 2.小児の手の届かない所に保管してください。
- 3.他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- 4.使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- 5.ビンの中の詰め物は、輸送中の錠剤の破損を防止するために入れてありますので、開封後は取り除いてください。
- 6.本剤にぬれた手で触れないでください。また、手にとった錠剤を元の容器にもどしますと、他の錠剤に影響を与えることがありますので注意してください。

医薬品
相談室

tel.044-233-2029

受付時間 9:00~17:00(日・祝日もぞく)

DHC

製造販売元
株式会社ディーエイチシー
東京都港区南麻布2-7-1

0120-333-906 www.dhc.co.jp