

この説明書は、ご使用前に必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

食べ過ぎ、飲み過ぎ、胃痛、もたれに

DHC 総合胃腸薬

<胃腸薬>

第2類医薬品

DHC総合胃腸薬は、胃の痛みを鎮め、弱った胃の働きを助ける顆粒タイプの胃腸薬です。荒れた胃粘膜を保護し、脂肪の消化を促すとともに、腹部膨満感を解消。3才以上の小さなお子様にも服用いただけます。携帯に便利な個包装入り。

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 次の人は服用しないでください。
透析療法を受けている人。
2. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。
胃腸鎮痛鎮痙薬
3. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。
(母乳に移行して乳児の脈が速くなることがあります。)
4. 長期連用しないでください。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 高齢者。
 - (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (5) 次の症状のある人。
排尿困難
 - (6) 次の診断を受けた人。
腎臓病、心臓病、緑内障、甲状腺機能障害

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

口のかわき、便秘

4. 2週間間服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

その他の注意

母乳が出にくくなる場合があります。

■ 効能・効果

胃痛、食欲不振(食欲減退)、胃部・腹部膨満感、消化不良、胃弱、食べ過ぎ(過食)、飲み過ぎ(過飲)、胸やけ、もたれ(胃もたれ)、胸つかえ、はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐、胃酸過多、胃部不快感、胃重、げっぷ(おくび)

■ 用法・用量

次の量を、食間又は食後に水又はお湯で服用してください。

年齢	1回量	服用回数
成人(15才以上)	1包	1日3回
11才以上15才未満	2/3包	
8才以上11才未満	1/2包	
5才以上8才未満	1/3包	
3才以上5才未満	1/4包	
3才未満	服用しないこと	

【用法・用量に関連する注意】

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

■ 成分・分量

1日量(3包:3.6g)中

成分	分量	はたらき
オウレン末	250mg	苦みや香りが神経を刺激することで胃液の分泌を促し、食欲を改善します。
ニンジン末	300mg	
ケイヒ末	300mg	
ショウキョウ末	100mg	
カンゾウ末	300mg	荒れた胃の粘膜修復を助け、痛みを和らげます。
ロートエキス散	300mg	胃酸の分泌を抑えて、痛みを和らげます。
メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	450mg	胃酸を中和し、荒れた胃の粘膜を保護します。
沈降炭酸カルシウム	895mg	胃酸を中和して胃壁への刺激を和らげます。
牛胆汁エキス末	150mg	胆機能を改善し、消化を助けます。
ジメチルポリシロキサン	60mg	胃腸内にたまったガスに働きかけ、排出を促します。

添加物として、バレイショデンプン、トメントール、カルメロースCa、ポビドンを含有します。

■ 保管及び取扱い上の注意

- 1.直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 2.小児の手の届かない所に保管してください。
- 3.他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- 4.使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- 5.分割して使用した残りは、分包の口を折り返して保管し、2日以内に使用してください。

医薬品
相談室

tel.044-233-2029
受付時間 9:00~17:00(日・祝日のぞく)

DHC

製造販売元
株式会社ディー・エイチ・シー
東京都港区南麻布2-7-1

0120-333-906 www.dhc.co.jp