

指定医薬部外品

CLEAR THROAT

のどスプレー

殺菌
成分

CPC^{*}配合

※セチルピリジニウム塩化物水和物

のどの炎症による
のどの痛み
あれ・不快感に

グレープフルーツ風味



30mL

88749/

A 1

【効能・効果】のどの炎症による

のどの痛み・のどのはれ・のどのあれ・のどの不快感・声がれ

【100mL中】

(有効成分)セチルピリジニウム塩化物水和物(0.3g)

(添 加 物)ℓ-メントール、濃グリセリン、D-ソルビトール液、エタノール、クエン酸水和物、クエン酸ナトリウム水和物、精製水、香料

【用法・用量】1日数回、適量をのどの粘膜面に噴霧塗布してください。

【相談すること】

1.次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師に相談すること

(1)医師又は歯科医師の治療を受けている人 (2)本人又は家族がアレルギー体質の人
(3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (4)次の症状がある人：口内のひどいただれ

2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師に相談すること

関係部位	症 状
皮ふ又は口腔	発疹・発赤、かゆみ又は刺激感

3.5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師に相談すること

【用法及び用量に関連する注意】①使用に際しては、この文書をよく読んでください。

②定められた用法・用量を守ってください。③息を吸いこみながら使用すると、薬液が気管支や肺に入ることがありますので、ノズルをのどの患部にむけて、軽く息をはきながら、2～3回噴射してください。④塗布にのみ使用し、内服しないでください。⑤小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。⑥目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。

【保管及び取り扱い上の注意】①直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。

②小児の手の届かない所に保管してください。③他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる場合があります。)④衣服等に付着した場合はすぐに水でよく洗い落としてください。⑤ノズルの先端の穴を針等で突かないでください。使用時に薬液が出にくくなったり、折れた時大変危険です。絶対におやめください。⑥使用期限のすぎた製品は、使用しないでください。⑦火気に近づけないでください。⑧本品使用後の一定時間は、呼気中に酒気帯び運転と判定される濃度以上のアルコール濃度が検出される可能性がありますので、運転中のご使用はお控えください。

製造番号

使用期限



台紙



フィルム:
PS, PET

発売元 白金製薬株式会社 〒634-0803 奈良県橿原市上品寺町515

製造販売元 ダイア製薬株式会社 〒634-0803 奈良県橿原市上品寺町515

お客様相談室 TEL：0744-21-5588 受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

2103A01