

富山常備薬

第3類  
ハダエール  
GB錠

29日分  
4日分

皮膚薬手帳に記入

富山常備薬

開封口

### 保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります)。(4)フタの閉め方が不十分な場合、又は落下等により衝撃が加ったとき錠剤が割れるおそれがありますので、服用のつど必ずフタはよく閉めてお取扱い等にご注意ください(割れた錠剤は容器よりお出しください)。(5)本品は糖衣錠ですから、水分が錠剤につくと表面の糖衣が一部溶けて変色又はムラを生ずることがありますので、ぬれた手で取扱わないようにしてください。又、一度取り出して手にのせた錠剤は、元に戻さないでください(変質防止のため)。(6)使用期限(外箱・ラベルに記載)を過ぎた製品は服用しないでください。なお、使用期限内であっても、一度開封した後は、品質保持の点から開封日より6カ月以内に服用してください。

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

お問い合わせ先 株式会社富山常備薬

医薬品相談窓口

☎0120-741-780

受付時間 9:00-18:00(年中無休)

発売元 株式会社富山常備薬

富山県富山市丸の内1-8-17

製造販売元 至誠堂製薬株式会社

奈良県御所市茅原220-1 版No.3

富山常備薬

富山常備薬

富山常備薬

富山常備薬

富山常備薬

容器の中の詰め物は錠剤の破損防止のためです。  
開封後に捨ててください。

開封年月日

開封時に記入してください。

販売名: 第3類医薬品

ハダエールGB錠

成分・分量 1日量(2錠)中

チアミンジスルフィド(ビタミンB<sub>6</sub>:誘導体)10mg、  
リボフラビン酪酸エステル(ビタミンB<sub>2</sub>:酪酸エステル)20mg、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB<sub>6</sub>)  
20mg、ピオチン(ビタミンH)50μg、オロチン酸  
80mg

添加物として、乳糖水和物、結晶セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、カルメロースカルシウム、軽質無水クアイ酸、ステアリン酸マグネシウム、ヒドロメロース、タルク、酸化チタン、白糖、アラビアゴム末、ポビドン、黄色4号、黄色5号、カルナウバロウを含む。

<成分・分量に関連する注意>

本剤の服用により尿が黄色くなる場合がありますが、これは本剤に含まれるリボフラビン酪酸エステル(ビタミンB<sub>2</sub>:酪酸エステル)によるものですから心配ありません。

### 効能・効果

○次の諸症状の緩和:口角炎(唇の両端の腫れ・ひび割れ)、口唇炎(唇の腫れ・ひび割れ)、口内炎、舌の炎症、湿疹、皮膚炎、かぶれ、ただれ、にきび・吹き出物、肌あれ、赤ら顔に伴う顔のほてり、目の充血、目のかゆみ(ただし、これらの症状について、1カ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談してください。)

○次の場合のビタミンB<sub>2</sub>の補給:肉体的疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

第3類医薬品

# 肌あれ 口内炎

## 飲んで効く医薬品

31日分  
62錠

# ハダエール GB錠

有効成分

ビタミンB<sub>2</sub>/ビタミンB<sub>6</sub>

ビタミンB<sub>2</sub>/ピオチン/オロチン酸

### 使用上の注意

服用前に、この説明文をよくお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

相談すること

1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
消化器	胃部不快感、胃部膨満感、食欲不振、吐き気・嘔吐

2.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

下痢

3.1カ月分服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

### 用法・用量

次の量を1日1回、食後に服用してください。

年齢	1回量
成人(15歳以上)	2錠
15歳未満	服用しないこと

<用法・用量に関連する注意>

①定められた用法及び用量を厳守してください。  
②容器に乾燥剤が入っておりますので、服用しないでください。



富山常備薬