

ここからお切りください。

開封後はチャックを閉じて保存してください。チャック



漢方生薬研究所

第3類医薬品

ト ー チ ラ ツ ク

□ のどの渇き・糖尿病・口渇
□ 血糖値が気になる方に

ケイヒ末

3000mg

225錠入



開封後はチャックを閉じて保存してください。 **チャック**

販売名： トーチラック **第3類医薬品**

▲ 使用上の注意

🗨️ 相談すること

1 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

1. 医師の治療を受けている人。
2. 妊婦又は妊娠していると思われる人。
3. 今までに薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

3 1カ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

【効能・効果】 口渇、のどの渇き、糖尿病

【用法・用量】 次の量を食後に服用してください。

年齢	成人(15歳以上)	15歳未満
1回量	5錠	服用しないこと
服用回数	1日3回	

<用法・用量に関連する注意>
定められた用法・用量を厳守してください。

【成分・分量】 1日量(15錠中)

成分	分量
ケイヒ末	3,000mg

添加物として、結晶セルロース、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウムを含む。

【保管及び取扱い上の注意】

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所にチャックを閉じて保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり、品質が変わります)。
4. 本品は吸湿性が高いので、湿気により変色や亀裂など品質に影響を与える恐れがありますので次の点にご注意ください。
 - 服用のつどアルミ袋のチャックをよく閉めてご使用ください。
 - ぬれた手で触れないでください。又、一度取り出して手に乗せた錠剤は元に戻さないでください(変質防止のため)。
5. 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。なお期限内であっても、一度開封した後は、品質保持の点から開封日より6カ月以内に服用してください。

発売元：株式会社ハーバルアイ
〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神
5丁目7番3号 福岡天神北ビル6階
製造販売元：至誠堂製薬株式会社
奈良県御所市茅原220-1

本製品についてのお問い合わせは、下記にお願い申し上げます。



漢方生薬研究所

お問い合わせ先：漢方生薬研究所
フリーダイヤル 0120-852-489
(受付時間/平日 10:00~17:00 土日祝定休日)

副作用被害救済制度：0120-149-931

使用期限 製造番号 版 No.2

