

効能・効果

筋肉痛、筋肉疲労、打撲、ねんざ、肩こり、腰痛、関節痛、しもやけ

用法・用量

1日1～2回患部に貼付してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 患部の皮膚は清潔にして貼ってください。

成分・分量

成分含量(膏体100g中)
 サリチル酸グリコール …… 2.0g
 トコフェロール酢酸エステル …… 1.0g

添加物として、エデト酸ナトリウム、グリセリン、酸化チタン、ゼラチン、D-ソルビトール、パラベン、ポリアクリル酸部分中和物、ポリビニルアルコール(部分けん化物)、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、その他4成分を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります)。
- (4) ご使用後は中身の乾燥を防ぐためしっかりとシールを開けてください。




製造番号

使用期限

袋 : PE, M, PET
 シールふた : PP, PET 2E175M

1枚ずつ
 取り出しやすい
 ポケシップ®



シップの
 サイズ
 そのまま

Hisamitsu® **10**枚入
 サイズ:10cm×14cm

外用薬
 経皮鎮痛消炎剤

のびのび®
サロンシップ® フィット®α



当社従来品に比べて
 包装サイズを小さく
 しました。



無臭性

第3類医薬品

筋肉痛・筋肉疲労・ねんざ・肩こり・腰痛

シップの端からはがれにくい



丸かど®シップ
 ▲開け口

薄い・密着
 はがれにくいシップ

冷感

▼本商品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、又は下記の「お客様相談室」までお願い申し上げます。

製造販売元 **久光製薬株式会社**

〒841-0017 鳥栖市田代大官町408番地
<https://www.hisamitsu.co.jp>

お客様相談室: ☎0120-133250

受付時間 / 9:00-17:50
 (土日・祝日・会社休日を除く)

▲当社HELLO!eacolプロジェクトの詳細はこちらへ。 副作用被害救済制度: ☎0120-149-931

詳しい情報は
 こちらへ▼



セルフメタマケーション
 税 控除対象

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。また、必要に応じてすぐ読めるように大切に保管してください。

第3類医薬品

〈冷感〉鎮痛消炎シップ剤

販売名: のびのび®サロンシップ®フィット®α

10枚入
 サイズ: 10cm×14cm

【ご使用方法】○表面のシールを開け口のところから開け、1枚ずつ取り出してお使いください。○中身の乾燥を防ぐため、ご使用後はシールを元のようにつかり閉めてください。

▲ 使用上の注意

×してはいけないこと

守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。

次の部位には使用しないでください。

- (1) 目の周囲、粘膜等。
- (2) 湿疹、かぶれ、傷口。

■ 相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、色素沈着

- 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。