

満量
処方

井藤漢方製薬

かぜのひきはじめ
頭痛・肩こりに

飲み
やすい
錠剤タイプ

葛根湯 エキス錠



第2類医薬品

セルフメディケーション

税 控除 対象

(販売名) イトーの葛根湯エキス錠

【効能】体力中等度以上のものの次の症状:感冒の初期(汗をかいていないもの)、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み



1回3錠

粒はイメージです

デザインはイメージです

※満量処方とは…

漢方処方より得られたエキスを
全量配合していることを意味します。

MADE IN JAPAN

✂ <キリトリ>

吸湿しやすいため、服用のつどチャックをしっかりと閉めること。 **漢方製剤**

(販売名) イトーの葛根湯エキス錠 **第2類医薬品**

⚠ 使用上の注意

👤 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

(1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。(4) 胃腸の弱い人。(5) 発汗傾向の著しい人。(6) 高齢者。(7) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。(8) むくみ、排尿困難の症状のある人。(9) 高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害の診断を受けた人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	皮膚	消化器
症 状	発疹・発赤、かゆみ	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	偽アルドステロン症、ミオパチー	肝機能障害
症 状	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる

3. 1ヵ月位(感冒の初期、鼻かぜ、頭痛に服用する場合には5～6回)服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能 体力中等度以上のものの次の症状：感冒の初期(汗をかいていないもの)、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

用法・用量 次の1回量を食前又は食間に水又は白湯で服用すること。

※食間とは…食後2～3時間のことです。

年 齢	1回量	服用回数
成人(15才～)	3錠	1日3回
7才～14才	2錠	
7才未満	×(服用しないこと)	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守すること。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

成分 1日量(9錠)中 葛根湯エキス2550mg(カッコン4g、マオウ3g、タイソウ3g、ケイヒ2g、シャクヤク2g、カンゾウ2g、ショウキョウ1gより抽出)

添加物として、メタケイ酸アルミン酸Mg、乳糖水和物、ステアリン酸Mg、軽質無水ケイ酸、ヒプロメロースを含有する。

保管及び取り扱い上の注意 (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。(2) 小児の手の届かない所に保管すること。(3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)(4) めれた手で触れないこと。(湿気により変色する場合がある。)(5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。なお、使用期限内であっても、袋開封後は早めに使用すること。

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

井藤漢方製薬株式会社

〒577-0012 大阪府東大阪市長田東2-4-1

お客様相談室

☎ 06-6743-3033

10:00～17:00(土日祝を除く)

101010004 5820243-1-MS223