

おなかにやさしい
非刺激性

腸内に水分を引き込んで軟便化

自然な

する〜り便

をうながす

目指せ! ”する〜りバナナ便”



酸化マグネシウム配合
便秘薬
ミデルモン

第3類医薬品

360錠



吸湿しやすいため、服用のつどチャックをしっかりしめて下さい。

この説明書は、服用前に必ずお読み下さい。また、必要時に読めるよう保管しておいて下さい。

販売名:ミデルモン

第3類医薬品

⚠ 使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないで下さい。

他の瀉下薬(下剤)



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい
(1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 高齢者。(4) 次の症状のある人: はげしい腹痛、吐き気・嘔吐。(5) 次の診断を受けた人: 腎臓病。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

関係部位	症 状	関係部位	症 状
消化器	はげしい腹痛、吐き気・嘔吐	呼吸器	息苦しい
精神神経系	強い眠気、意識がうすれる	その他	筋力の低下、口のかわき
循環器	立ちくらみ、脈が遅くなる		

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい
下痢
- 1週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

効能又は効果

○便秘 ○便秘に伴う次の症状の緩和: 頭重、のぼせ、肌あれ、吹出物、食欲不振(食欲減退)、腹部膨満、腸内異常発酵、痔

用法及び用量

次の量を就寝前にコップ1杯の水で服用して下さい。ただし、初回は最小量を用い、便通の具合や状態をみながら少しずつ増量又は、減量して下さい。

年 齢	1回量	1日服用回数	年 齢	1回量	1日服用回数
大人(15歳以上)	3~6錠	1回	5歳~6歳	1~2錠	1回
11歳~14歳	2~4錠		乳幼児(5歳未満)	服用しないこと	
7歳~10歳	2~3錠				

<用法及び用量に関連する注意> (1) 定められた用法、用量を厳守して下さい。(2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

成分及び分量 6錠(大人の1日量)中

成 分	含 量
酸化マグネシウム	2000mg

添加物としてクロスカルメロースナトリウム、ショ糖脂肪酸エステル、結晶セルロースを含有する。

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に、密栓して保管して下さい。(2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。(3) 他の容器に入れかえないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- 使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。



本製品に関するお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

原沢製薬工業株式会社 お客様相談室

電話: (03) 3441-5191

受付時間: 9:30~17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

製造番号

使用期限

販売元
株式会社シーディ
埼玉県草加市谷塚上町575-6

製造販売 原沢製薬工業株式会社
東京都港区高輪3丁目19番17号

MADE IN JAPAN
KA1M1Z①

