

耳薬

耳薬

耳薬

鎮痒消炎薬 第②類医薬品

デシトンEH液

耳の中の皮膚に薬液を塗布する際は、耳の奥や鼓膜を傷つける恐れがありますので、耳の奥まで綿棒を入れないでください。綿棒の先から約1.5cmの部分(綿棒の下)を持って、揺らすにやさしく塗布してください。

【耳に使用する際の注意】

(1)本剤は点耳薬ではありませんので、耳の中に直接滴下しないでください。(2)耳の中の皮ふに使用する場合は、容器裏面の記載事項を必ず守ってください。(3)長期連用しないでください。(目安として2週間以内)(4)鼓膜に穴が開いていることが疑われるまたは耳だれが出ている場合は、使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。(5)使用後、耳が腫れにくくなった場合は、使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。(6)本剤の使用開始目安年齢は10歳以上です。なお、小児(15歳未満)だけの使用はおやめください。(7)本剤塗布直後はイヤホンや補聴器を使用せず、十分に乾いたことを確認してから使用してください。(目安として1時間後)

本剤について、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただけますようお願い申し上げます。

消費者相談窓口:
協和薬品工業株式会社 お客様相談室
☎058-246-8771
受付時間 9:00~12:00・13:00~17:00
(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度
☎0120-149-931

目には入れないこと

火気厳禁
第二石油類、危険等級Ⅲ
(エタノール)

製造 協和薬品工業株式会社
販売元 岐阜県岐阜市野一色二丁目8番6号

A2204



すばやくかゆみを鎮め
患部の炎症を抑える

デシトンEH液

第②類医薬品



耳の中に

綿棒で塗る

耳のまわりに

ピンポイント容器で直塗り

*本品に綿棒は付属されていません

8つの有効成分
PVA配合 抗炎症成分



耳の中に直接滴下しないでください。
耳の中の皮ふに使用する場合は裏面の記載事項を厳守してください。

第②類医薬品

ご使用に際して、このケースの記載内容必ず読んでください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第②類医薬品

【販売名】デシトンEH液
【効能・効果】かゆみ、湿疹、皮膚炎、かぶれ、じんましん、あせも、虫さされ
【用法・用量】1日数回、適量を患部に塗布してください。

【用法・用量に関する注意】(1)定められた用法・用量を守ってください。(2)小児に使用される場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(3)目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合にはすぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。(4)本剤は外用にのみ使用し内服しないでください。(5)患部が傷になってしまっている場合は、塗布したときにしみる場合があります。

【容器の使用法】(1)使用前に、容器の先端を上に向けて、手の指で中栓の先を2~3回空押しして中の空気を抜いてください。(暑い時期、高温の場所に置かれた場合や薬液が少なくなった場合などに、容器内の圧力が高まり薬液が多く出ることがありますので、これを防ぐためです。)(2)使用するときには容器を下向き又は斜めにして、先端を患部に軽く押し当てて塗布してください。容器の先端を患部から離すと液が出なくなります。(強く押し当てたり、容器胴部を強く握ると薬液が多く出ます。)
【成分・分量】(100mL中) プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル(アンテドラッグステロイド剤 PVA) 0.15g、ジフェニヒドラミン塩酸塩 2.0g、クロタミトン 3.0g、グリチルリチン酸二カリウム 0.2g、トメントール 3.5g、リドカイン 1.0g、イソプロピルメチルフェニール 0.1g、アラントイン 0.2g 添加物として、1,3-ブチレンジグリコール、ジブチルヒドロキシトルエン、エタノール、pH調整剤、疎水化ヒドロキシプロピルメチルセルロースを含有します。

【保管及び取扱い上の注意】(1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)(4)火気に近づけないでください。また、使用後は火中に投じないでください。(5)メガネ、時計、アクセサリー等の金属類、プラスチック類、化繊の衣類、皮革製品、床や家具などの塗装面等に付着すると変質することがありますので、付着しないように注意してください。(6)染めた髪につくと色落ちすることがあります。(7)使用後はキャップをしっかり締めてください。(8)使用期限(箱底面に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。

使用上の注意

☒してはいけないこと
守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります
1. 次の部位には使用しないでください
(1)水痘(水ぼうそう)、みずむし(たむし)等又は化膿している患部。(2)創傷面、目の周囲、粘膜等。
2. 顔面には、広範囲に使用しないでください
3. 長期連用しないでください

☒相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 薬などによりアレルギー症状(発疹・発赤、かぶれ等)を起こしたことがある人。
(4) 患部が広範囲の人。(5) 湿潤やただれのある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、このケースを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、乾燥感、刺激感、熱感、ヒリヒリ感
皮膚(患部)	みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

3.5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、このケースを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

大容量
30mL

かゆみ かぶれ しっしん

セルフメディケーション
税控除対象

耳などのかゆみ

8つの有効成分
PVA配合 抗炎症成分



第②類医薬品



台製京橋
副領出第

