

鎮痒消炎薬 Anti-itching Agent

第2類
医薬品

エクシロンプロUFクリーム

省資源化のため、箱が説明書を兼ねています。
ご使用に際して、この箱の説明をよくお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

効能・効果：皮膚炎、湿疹、かゆみ、かぶれ、ただれ、あせも、おむつかぶれ

用法・用量

1日数回、適量を患部に塗布してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

(1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(2) 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。(3) 外用にのみ使用してください。(4) 患部を清潔にした後、塗布してください。

成分・分量 (100g中)

ウフェナマート	5.0g
ジフェンヒドラミン	1.0g
グリチルレチン酸	0.3g
トコフェロール酢酸エステル	0.5g
ベンゼトニウム塩化物	0.1g

添加物：白色ワセリン、ステアリルアルコール、セタノール、モノステアリン酸グリセリン、パルミチン酸イソプロピル、ペヘニルアルコール、セトマクロゴール1000、ジメチルポリシロキサン、パラベン、ジブチルヒドロキシトルエン

△使用上の注意

相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1) 医師の治療を受けている人 (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (3) 湿潤やただれのひどい人
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、刺激感(ヒリヒリ感)、熱感、乾燥感

- 1～2週間くらい使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わります。)(4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく早く使用してください。(品質保持のため)


開
け
口

製造販売元 万協製薬株式会社
三重県多気郡多気町五桂1169-142

万協製薬株式会社「お客様相談室」
電話 0598-30-5376

受付時間 10:00～17:00 (ただし、土、日は除きます。)

副作用被害救済制度 ☎0120(149)931



MADE IN JAPAN

