

ご使用に際して、この説明文を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

外皮用薬

第2類医薬品 フェネベールHPクリーム

8g

△使用上の注意

☒してはいけないこと(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
1. 次の人は使用しないでください(1)出血性血液疾患(血友病、血小板減少症、紫斑病など)の人。(2)わずかな出血でも重大な結果をきたすことが予想される人。(血液凝固抑制作用を有し出血を助長するおそれがあります。)
2. 次の部位には使用しないでください 目や目の周囲、粘膜(口腔、鼻腔、膣など)。

■相談すること 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください(1)医師の治療を受けている人。(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(3)湿潤やただれのひどい人。2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、紫斑

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果 乾皮症、小児の乾燥性皮膚、手指の荒れ、ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、手足のひび・あかぎれ、しもやけ(ただれを除く)、きず・やけどのあとの皮膚のしこり・つっぱり(顔面を除く)、打ち身・ねんご後のはれ・筋肉痛・関節痛

用法・用量 1日1～数回、適量を患部にすりこむか、又はガーゼなどにのばして貼ってください。
用法・用量に関連する注意(1)定められた用法・用量を守ってください。(2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(3)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。(4)外用にのみ使用してください。※出血のある傷口には使用しないでください(血が止まりにくくなる場合があります。)。※かさぶたには使用しないでください。※顔面にある傷あと、やけどのあとには使用しないでください。

成分・分量 100g中 ヘパリン類似物質 0.3g
添加物:ワセリン、流動パラフィン、ミリスチン酸オクチルドデシル、BHT、ポリオキシエチレンアラキルエーテル、ステアリルアルコール、ポリソルベート60、ジメチルポリシロキサン、パラベン、1,3-ブチレングリコール、カルボキシビニルポリマー、pH調整剤、香料

保管及び取扱い上の注意 (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり、品質が変わるおそれがあります。)(4)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

副作用被害救済制度 電話:0120-149-931

製造番号

製品に関するお問い合わせ
新大和漢方株式会社 お客様相談窓口
電話:0120-702-866(フリーダイヤル)
受付時間:9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

使用期限

発売元 新大和漢方株式会社 福岡市早良区千隈3-16-1
製造販売元 シオノケミカル株式会社 東京都中央区八重洲2-10-10



72411914-A

A

この製品は透明のパウチ袋に入っていますので、パウチ袋からチューブを取り出して使用してください。
ご購入時にパウチ袋が無い場合や、パウチ袋に破れや開封されたような痕がある場合は使用しないでください。