

# 開け口

省資源化のため、箱が添付文書を兼ねています。  
ご使用に際して、この箱の記載内容を必ず読んでください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

【販売名】液体プロウ1S  
(鎮痒消炎薬)

【容量】50mL **第②類医薬品**

## 【成分・分量】100mL中

デキサメタゾン酢酸エステル・・・25mg  
ジフェンヒドラミン塩酸塩・・・1.0g  
ℓ-メントール・・・3.0g  
dℓ-カンフル・・・2.0g  
イソプロピルメチルフェノール・・・0.1g  
添加物として、ジブチルヒドロキシル  
エン、ラウロマクロゴール、エタノール  
を含有します。

## 【効能・効果】

湿疹、皮膚炎、あせも、かぶれ、かゆみ、  
しもやけ、虫さされ、じんましん

## 【用法・用量】

1日数回、適量を患部に塗布してください。

## 【用法及び用量に関連する注意】

- (1) キャップをとりはずし、スポンジ部分を肌に1～2回軽く押し当てて、スポンジに薬液をしみ込ませてからご使用ください。
- (2) 定められた用法・用量を守ってください。
- (3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (4) 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (5) 外用にのみ使用してください。

## ⚠ 使用上の注意

### ❌ してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
1. 次の部位には使用しないでください。  
(1) 水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等又は化膿している患部。  
(2) 創傷面、目の周囲、粘膜等。
  2. 顔面には、広範囲に使用しないでください。
  3. 長期連用しないでください。

### 🗨 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
(1) 医師の治療を受けている人。  
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。  
(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(4) 患部が広範囲の人。  
(5) 湿潤やただれのひどい人。
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
皮膚(患部)	みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

3. 5～6日間使用しても症状がよくなるらない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931



4 535653 001709

**かゆみ止め**  
Antipruritic

**抗炎症**  
Anti-Inflammatory

**殺菌**  
Sterilization

**清涼感**  
Refreshing Feeling



# 液体 プロウ1 S

Insect Bite Medicine

## しつこいかゆみ

## はれに

**虫さされ**  
Insect Sting

**かゆみ**  
Itching

セルフメディケーション  
税 控除 対象

**第②類医薬品 50mL**

はれにデキサメタゾン酢酸  
エステルが効く



かゆみに、  
ジフェンヒドラミン塩酸塩が効く



柔らかい  
肌に優しい  
スポンジ

## 【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して立てて保管してください。(容器を横向きなどで保管すると振動などにより薬液が出過ぎたり、液漏れの原因となる場合があります)
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4) 火気に近づけないでください。
- (5) メガネ、時計、アクセサリ、プラスチック類、化繊製品、皮革製品、床や家具などの塗装面等に付着すると変質することがありますので、付着しないように注意してください。
- (6) 使用期限(箱及び容器に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。
- (7) 使用後は必ずキャップを十分に締めてください。

製造販売元 万協製薬株式会社  
三重県多気郡多気町五桂1169-142

お客様相談室  
電話 0598-30-5376  
受付時間10:00～17:00(ただし土、日、祝日は除きます)