

開け口

省資源化のため、箱が添付文書を兼ねて
います。
ご使用に際して、この箱の記載内容を必
ず読んでください。また、必要な時に読め
るよう大切に保管してください。

【販売名】液体プロウ1S

(鎮痒消炎薬)

【容量】50mL 第②類医薬品

【成分・分量】100mL中

デキサメタゾン酢酸エステル・・・25mg
ジフェニドラン塩酸塩・・・1.0g
ℓ-メントール・・・3.0g
dl-カンフル・・・2.0g
イソプロピルメチルフェノール・・・0.1g
添加物として、ジブチルヒドロキシトル
エン、ラウロマクロゴール、エタノール
を含有します。

【効能・効果】

湿疹、皮膚炎、あせも、かぶれ、かゆみ、
しもやけ、虫さされ、じんましん

【用法・用量】

1日数回、適量を患部に塗布してください。

（用法及び用量に関連する注意）

- (1) キャップをとりはすし、スポンジ部分
を肌に1〜2回軽く押し当てて、スポ
ンジに薬液をしみ込ませてからご
使用ください。
- (2) 定められた用法・用量を守ってくだ
さい。
- (3) 小児に使用させる場合には、保護者
の指導監督のもとに使用させてく
ださい。
- (4) 目に入らないよう注意してください。
万一、目に入った場合には、これを
水又はぬるま湯で洗ってください。
なお、症状が重い場合には、眼科医
の診療を受けてください。
- (5) 外用にのみ使用してください。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、
副作用が起こりやすくなります)
1. 次の部位には使用しないでください。
(1) 水痘(水ぼうそう)、みずむし・た
むし等又は化膿している患部。
(2) 創傷面、目の周囲、粘膜等。
 2. 顔面には、広範囲に使用しないでく
ださい。
 3. 長期連用しないでください。

🗨 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は
登録販売者に相談してください。
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われ
る人。
(3) 薬などによりアレルギー症状を
起こしたことがある人。
(4) 患部が広範囲の人。
(5) 湿潤やただれのひどい人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合
は副作用の可能性があるため、直
ちに使用を中止し、この箱を持って
医師、薬剤師又は登録販売者に相
談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
皮膚(患部)	みずむし・たむし等の白 癬、にきび、化膿症状、持 続的な刺激感

3. 5〜6日間使用しても症状がよくなら
ない場合は使用を中止し、この箱
を持って医師、薬剤師又は登録販
売者に相談してください。

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931



4 535653 001709

MADE IN JAPAN

かゆみ止め
Antipruritic

抗炎症
Anti-Inflammatory

殺菌
Sterilization

清涼感
Refreshing Feeling



液体
プロウ1S
Insect Bite Medicine

しつこいかゆみ

はれに

虫さされ
Insect Sting


かゆみ
Itching

セルフレメディケーション
税 控除 対象

第②類医薬品

50mL

はれにデキサメタゾン酢酸
エステルが効く



【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に
密栓して立てて保管してください。
(容器を横向きなどで保管すると振
動などにより薬液が出過ぎたり、液
漏れの原因となる場合があります)
- (2) 小児の手の届かない所に保管して
ください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わ
ります)
- (4) 火気に近づけないでください。
- (5) メガネ、時計、アクセサリ、プラス
チック類、化繊製品、皮革製品、床や
家具などの塗装面等に付着すると変
質することがありますので、付着しな
いように注意してください。
- (6) 使用期限(箱及び容器に記載)を過ぎ
た製品は使用しないでください。
- (7) 使用後は必ずキャップを十分にしめ
てください。

製造販売元 万協製薬株式会社
三重県多気郡多気町五柱 1169-142

お客様相談室
電話 0598-30-5376
受付時間 10:00〜17:00(ただし土、祝日は除きます)