

省資源化のため箱が添付文書を兼ねています。
ご使用に際して、この箱の説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

販売名
キズムケア

第3類医薬品 12g

 使用上の注意

 **してはいけないこと**

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の部位には、使用しないでください。
 - (1) 目や目の周囲、粘膜(例えば、口腔、鼻腔、膣など)
 - (2) ただれ、化膿している患部、出血している患部、傷口の大きい患部
 - (3) 顔面、頭部
 - (4) ヒゲそり、除毛、脱毛等により傷んだ皮膚

 **相談すること**

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 使用後次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ

効能・効果 ひび、あかぎれ、さかむけ、小きりきず、すりきず

用法・用量 患部を清潔にし、傷部のみに適量を塗り、そのまま静かに乾燥させてください。
※最初にご使用になる時は、キャップを逆さにしてチューブの口に強く押し込んで穴をあけてください。

【用法・用量に関連する注意】 (1) 用法・用量を守ってください。(2) 患部やその周辺が汚れたまま使用しないでください。(3) 患部が汗や水でぬれている場合は水分をよく拭き取ってから使用してください。(4) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合は、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。(5) 外用にのみ使用し絶対に内服しないでください。(6) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとで使用してください。(7) 傷口以外に広く塗らないでください。(8) 傷口に塗ると一瞬しみるがありますが、乾燥するとしみなくなります。(9) 固まった皮膜を無理に剥がそうとすると、皮膚を傷つけてしまう可能性がありますので充分お気をつけください。

製造販売元 万協製薬株式会社
三重県多気郡多気町五桂1169-142

成分・分量 (100g中) ピロキシリン 12g

添加物：dl-カンフル、ヒマシ油、ミリスチン酸イソプロピル、酢酸エチル、エタノール

保管及び取扱い上の注意

- (1) 高温をさけ、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。(密栓しないと薬剤が固まる恐れがあります)
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わります)
- (4) **火気に近づけないでください。**
- (5) 誤飲(指をしゃぶるなど)の恐れがある場合は使用をさけてください。
- (6) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
- (7) 衣類、家具、床等につくと、非常にとれにくく、色調に変化をきたす恐れがありますので、使用の際は十分に注意してください。

万協製薬株式会社「お客様相談室」
電 話 0598-30-5376
受付時間 10:00～17:00 (ただし、土、日、祝日は除きます。)