

## 開封口

省資源化のため、箱が説明書を兼ねています。ご使用に際して、この箱の説明を必ずお読みください。また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

販売名：ナリースル  
〈鼻炎用点鼻薬〉

第2類医薬品

### 【効能・効果】

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：鼻づまり、鼻みず、くしゃみ、頭重

### 【用法・用量】

成人（15歳以上）及び7歳以上の小児：1回に1～2度ずつ、1日1～5回、鼻腔内に噴霧してください。なお、適用間隔は3時間以上おいてください。

### 【用法・用量に関連する注意】

- (1) 過度に使用すると、かえって鼻づまりを起こすことがあります。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 点鼻用にのみ使用してください。

### 【成分・分量】（100mL中）

ナファゾリン塩酸塩…0.05g  
クロルフェニラミンマレイン酸塩…0.5g  
リドカイン…0.5g  
グリチルリチン酸二カリウム…0.3g  
ベンザルコニウム塩化物…0.02g

添加物として、グリセリン、塩酸を含有します。

万協製薬株式会社

「お客様相談室」

電話番号 0598-30-5376

受付時間 10:00～17:00

（ただし 土、日、祝日は除きます）

製造販売元

万協製薬株式会社

三重県多気郡多気町五桂1169-142



4 535653 001631



キャップ  
ノズル  
ボトル



箱

## ⚠ 使用上の注意

### ❌ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）

1. 次の人は使用しないでください  
本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 長期連用しないでください

### 🗨️ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください  
(1) 医師の治療を受けている人。  
(2) 妊婦または妊娠していると思われる人。  
(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(4) 次の診断を受けた人。  
高血圧、心臓病、糖尿病、甲状腺機能障害、緑内障
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
鼻	はれ、刺激感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください

症状の名前	ショック (アナフィラキシー)
症状	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3. 3日間位使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この箱を持って、医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

## 5つの有効成分配合

抗アレルギー  
抗ヒスタミン

鼻炎スプレー

アレルギー性鼻炎に！



鼻づまり  
鼻水に

Collunarium

税 控除 対象

第2類医薬品



## 保管及び取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります）
4. 他の人と共用しないでください。
5. 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。また、開封後は使用期限内であっても、なるべく速やかに使用してください。

## （使用方法）

1. キャップをはずします。
2. 初めてご使用の際は、液が噴霧するまではね部を数回、空押ししてください。
3. 右図のように容器を持ち、ノズルを鼻腔内に少し差し入れます。



4. 静かに息を吸い込みながら、はねを下まで押し、1回に1度ずつ噴霧してください。  
\*できるだけ垂直に近い角度でお使いください。



5. 使用後は清潔なティッシュペーパーやガーゼなどでノズルを拭きキャップをして保管してください。

## 【液が残っている音はするが出ない時】

液を吸い上げるチューブは右図のような構造になっています。緩やかなカーブがついていまずので容器をかたむけずお使い頂くと、むだなくお使いいただけます。



噴霧口を針などで突くのはおやめください。故障の原因となります。



副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931