



第2類医薬品

開封口

ご使用に際して、この箱の説明文書をお読み下さい。
また、必要な時に従うように大切に保存して下さい。

販売名：防風通聖散 貴祓薬

△ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと 他の薬(下剤)

2. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること

☒ 相対すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

(1) 医師の治療を受けている人、

(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人、

(3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)、

(4) 胃腸が弱く下痢しやすい人、

(5) 発汗傾向の著しい人、

(6) 高齢者、

(7) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等をおこしたことがある人、

(8) 次の症状を受けた人。高血圧、心臓病、腎臓病、甲狀腺機能障害

製造番号

使用期限

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、嘔吐、食欲不振、胃部不快感、腹部膨満、はげしい腹痛を伴う下痢、悪露
精神神経系	めまい
その他	発汗、動悸、むくみ、頭痛

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合には直ちに医師の診察を受けること。

症状の名称	症状
間質性肺炎	胸焼けの上っぱり、少し無理をしたたりすると息切れがある。息苦しくなる。空咳、発熱等がみられ、これが繰り返らわたり、持続したりする。
偽アルドステロン症、三オチパー	手足のだるさ、しびれ、つばつり感やこむら返りに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に悪くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
過敏腸解離性疾患	長期服用により、腹痛、下痢、便秘、腹部膨満等が繰り返らわられる。

3. 服用後、次の症状があらわれたことがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。下痢、便秘

4. 1ヵ月位(最初に服用する場合には1週間)の服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。5. 長期服用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

第2類医薬品

270錠

当薬有薬川蜀山宛み送贈厚持主基前芥防風



防風通聖散 貴祓薬

お腹の脂肪・むくみ・便秘に

体力充実して、腹部に皮下脂肪が多く、便秘がちな方に

防風通聖散エキス 2750mg

(効能・効果) 体力充実して、腹部に皮下脂肪が多く、便秘がちなものの次の諸症：高血圧や肥満に伴う動悸・肩こりのほせ、むくみ・便秘、蓄膿症(副鼻腔炎)、湿疹・皮膚炎、ふきでもの(かじり)、肥満症(成分・分量) 1日量(9錠) 中 防風通聖散エキス(1/2錠) 2750 mgを含む。(トクナシワヤチセキユウカンジンシレンキョウハツカクメイガイ、ボクフウマオウ9.0g、シヨウキョウ0.5g、ダイオウ0.75g、黒水ボクフウ0.375g、ジャクワン1/4、半キョウフウ0.5g、カンゾウ1.0g、カニセキ1.5g)を抽出し、

添加物として、ステアリン酸Mg、タルク、無水ケイ酸、セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、酸化チタン、マクロゴール、カルボキシメチルセルロースを含む。(用法・用量) 次の量を1日3回。食前又は食間。水又は白濁で服用して下さい。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	3錠	3回
15歳未満(5歳以上)	2錠	
5歳未満	服用しないこと	

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

(保管及び取扱い上の注意) (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) の容器に入替えしないでください。(原用原因になつたり品質が変わる。)(4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

(発売元 お問い合わせ先)
株式会社アーマー(お祓薬部)
京都府西京区御陵1番地4-9
携帯電話 0570-041-005
固定電話 ☎0120-678-005

受付時間9:00~17:45(GW・お盆・年末年始を除く)
株式会社セルメックス
奈良県五條市住川1420番地

副作用被害救済制度 電話0120-149-931

AS-1

