

第2類医薬品

五苓散

顆粒
42包



第2類医薬品

五苓散

顆粒
42包



漢方処方^レ五苓散^が、体内の水分バランスの乱れに伴う症状を改善します

第2類医薬品

五苓散顆粒



気圧の変化、飲みすぎなどによる頭痛・二日酔い・むくみ



顆粒
42包

頭痛・二日酔いなどの不快感に

頭痛・二日酔いなどの不快感に

体力に関わらず使用でき、のどが渇いて尿量が少ないもので、めまい、はきけ、嘔吐、腹痛、頭痛、むくみなどのいずれかを伴う方に

体力に関わらず使用でき、のどが渇いて尿量が少ないもので、めまい、はきけ、嘔吐、腹痛、頭痛、むくみなどのいずれかを伴う方に

【用法・用量】

1日3回食前又は食間に水かお湯で服用してください。

年齢	1回量	服用回数
成人(15歳以上)	1包	1日3回
7歳以上 15歳未満	2/3包	
4歳以上 7歳未満	1/2包	
2歳以上 4歳未満	1/3包	
2歳未満	服用しないこと	

※食間とは食後2～3時間を指します。

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2) 定められた用法・用量を厳守してください。

【成分・分量】

成人1日量3包(1包1g)中 日局五苓散エキス1.69g

成分	分量	成分	分量
日局タクシャ	5g	日局ビャクジュツ	3g
日局チヨレイ	3g	日局ケイヒ	2g
日局ブリヨウ	3g	より製した乾燥エキス	

添加物：乳糖水和物、結晶セルロース、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム

<成分・分量に関連する注意>

本剤は天然物(生薬)のエキスを用いていますので、顆粒の色調等が多少異なることがあります。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 湿気などにより薬が固化する場合がありますので、1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、速やかに服用してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

【お客様相談室】 ☎ 06-6423-0565

(祝日を除く月～金曜日10:00～17:00)

【製造販売元】

株式会社 阪本漢法製薬
兵庫県尼崎市名神町1-5-12

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

押して開ける

漢方製剤
第2類医薬品

服用前にこの箱の説明書を必ずお読みください。また、添付文書は挿入しておりませんので、必要なときに読めるよう、この箱を大切に保管してください。

【販売名】サカンポー五苓散顆粒

【特徴】

- 「五苓散」は、体力に関わらず使用できます。のどが渇いて尿量が少なく、めまい、はきけ、嘔吐、腹痛、頭痛、むくみなどのいずれかを伴う「頭痛」、「二日酔い」などの症状を改善するための処方です。
- 真夏日などの「暑気あたり」や「水様性下痢」に効果があり、夏にもおすすめの処方です。
- 本剤は「五苓散」の1日最大量の生薬より抽出したエキスを配合した満量処方、飲みやすく服用量を調節しやすい顆粒です。
- 本剤は眠くなる成分を含みませんので、仕事や車の運転にも支障はありません。

△ 使用上の注意

相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
- 1ヵ月位(急性胃腸炎、二日酔いに服用する場合には5～6回、水様性下痢、暑気あたりに服用する場合には5～6日間)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】

体力に関わらず使用でき、のどが渇いて尿量が少ないもので、めまい、はきけ、嘔吐、腹痛、頭痛、むくみなどのいずれかを伴う次の諸症：水様性下痢、急性胃腸炎(しぶり腹のものには使用しないこと)、暑気あたり、頭痛、むくみ、二日酔い

<効能又は効果に関連する注意>

しぶり腹とは、残便感があり、くり返し腹痛を伴う便意を催すものである



4 987076 626531

製造番号

使用期限



袋:PE、金属



箱

S2