

満量処方

これいさん

五苓散

第2類医薬品

15包

15包

【用法・用量】

1日3回食前又は食間に水かお湯で服用してください。

年 齢	1回量	服用回数
成人（15歳以上）	1 包	1日3回
7歳以上 15歳未満	2/3 包	
4歳以上 7歳未満	1/2 包	
2歳以上 4歳未満	1/3 包	
2歳未満	服用しないこと	

※食間とは食後 2～3 時間を指します。

<用法・用量に関連する注意>

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【成分・分量】

成人1日量3包(1包1g)中 日局 五苓散エキス1.69g

成 分	分量	成 分	分量
日局 タクシャ	5g	日局 ジャクジュツ	3g
日局 チョレイ	3g	日局 ケイヒ	2g
日局 ブクリョウ	3g	より製した乾燥エキス	

添加物：乳糖水和物、結晶セルロース、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム

※本剤は天然物（生薬）のエキスをを用いていますので、顆粒の色調等が多少異なることがあります。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)1包を分割した残りを服用する時は、袋の口を折り返して保管し、速やかに服用してください。

眠くなる成分は入っていません

満量処方

これいさん
五苓散

気圧の変化による
天気頭痛に

のみやすい



顆粒タイプ

体力に関わらず使用でき、のどが渇いて尿量が少ないもので、めまい、はきけ、嘔吐、腹痛、頭痛、むくみなどのいずれかを伴う方に

この箱は本剤とともに保管し、服用の際にはよくお読みください。 漢方製剤 第2類医薬品

【販売名】五苓散顆粒SK

△使用上の注意

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
(3) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
3. 1か月位(急性胃腸炎、二日酔に服用する場合には5～6回、水様性下痢、暑気あたり)に服用する場合には5～6日間)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【お客様相談室】 ☎ 06-6423-0565
(祝日を除く月～金曜日10:00～17:00)

【製造販売元】

株式会社 阪本漢法製薬
兵庫県尼崎市名神町1-5-1 2

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

押して開ける

満量処方

これいさん
五苓散

低気圧など
天気による
不快を感じる方
頭痛・むくみ

顆粒15包
第2類医薬品

【効能・効果】

体力に関わらず使用でき、のどが渇いて尿量が少ないもので、めまい、はきけ、嘔吐、腹痛、頭痛、むくみなどのいずれかを伴う次の諸症：水様性下痢、急性胃腸炎(しづり腹のものには使用しないこと)、暑気あたり、頭痛、むくみ、二日酔<効能又は効果に関連する注意>しづり腹とは、残便感があり、くり返し腹痛を伴う便意を催すものことである



4 987076 626548



袋：PE、金属



箱

製造番号

使用期限