

第2類医薬品 メジャラックゴールドZST

大容量
30日分
450錠

満量処方

おなかの
脂肪を落とす
肥満症に効く
肥満症、むくみ、便秘が
気になる方へ

セルフメディケーション
税控除対象

大容量
30日分
450錠

満量処方

おなかの
脂肪を落とす
肥満症に効く
肥満症、むくみ、
便秘が気になる方へ



肥満症に効く!!
18種類の生薬配合

史上最高峰[※]
有効成分量**6000mg**配合

※阪本漢法の防風通聖散シリーズ史上

脂肪を分解・燃焼・排出



生活習慣による
肥満症の改善

史上最高峰[※]
6000 mg配合

※阪本漢法の防風通聖散シリーズ史上

防風通聖散が効く!

体力充実して、腹部に皮下脂肪が多く、便秘がちな方の
肥満症、高血圧や肥満に伴う症状
(どうき、肩こり、のぼせ、便秘、むくみ)

第2類医薬品

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931



4 987076 405341

製造番号

使用期限

S1

△ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと
他の薬下薬(下剤)

2. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること

▣ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
(3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人) (4) 胃腸が弱く下痢しやすい人 (5) 発汗傾向の著しい人 (6) 高齢者 (7) 今までに薬などにより発疹・発赤・かゆみ等を起こしたことがある人 (8) 次の症状のある人:むくみ、排尿困難 (9) 次の診断を受けた人:高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤・かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐・食欲不振・胃部不快感・腹部膨満・はげしい腹痛を伴う下痢・腹痛
精神神経系	めまい
その他	発汗・動悸・むくみ・頭痛

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これからが急にあらわれたり、持続したりする。
偽アルドステロン症、ミオパシー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱・かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腸間膜静脈硬化症	長期服用により、腹痛、下痢、便秘、腹部膨満等が繰り返しあらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること: 下痢、便秘

4. 1ヶ月位(便秘に服用する場合には1週間位)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

5. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

押して開ける

この箱は本剤とともに保管し、服用の際にはよくお読みください。

【販売名】メジャラックゴールドZST

漢方製剤

【効能・効果】

体力充実して、腹部に皮下脂肪が多く、便秘がちなものの次の諸症: 高血圧や肥満に伴う動悸・肩こり・のぼせ・むくみ・便秘、蓄膿症(副鼻腔炎)、湿疹・皮膚炎、ふきでもの(にきび)、肥満症

【用法・用量】

次の量を食前又は食間に水かお湯で服用してください。

年 齢	1回量	服用回数
成人(15歳以上)	5錠	00000
15歳未満	×	服用しないでください

*食間とは食後2~3時間を持ちます。

<注意> 定められた用法・用量を厳守してください。

【成分・分量】

1日量15錠中 日局 防風通聖散エキス 6,000mg

[キヨウ2g、ビャクジユツ2g、カンゾウ2g、オウゴン2g、セココウ2g、ダイオウ1.5g、トウキ1.2g、シャクヤク1.2g、センキュウ1.2g、サンシシ1.2g、レンギョウ1.2g、ハッカ1.2g、ケイガイ1.2g、ボウフウ1.2g、マオウ1.2g、ショウキョウ0.4g、カッセキ3g、ボウショウ1.5g] より製した乾燥エキス

添加物: バレイショデンプン、メタケイ酸アルミニ酸マグネシウム、ステアリン酸マグネシウム

<注意> 本剤は天然物(生薬)のエキスを用いていますので、錠剤の色調等が多少異なることがあります。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。
(2) 小児の手の届かない所に保管すること。

- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わること。)

- (4) ぬれた手で取り扱わないこと。(水分は錠剤が変色する原因になる。)

- (5) ピンの中の詰め物は開封時に捨てること。

- (6) 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。

【お客様相談室】 ☎ 06-6423-0565
(祝日を除く月~金曜日10:00~17:00)

【製造販売元】 ◆ 株式会社 阪本漢法製薬

兵庫県尼崎市名神町1-5-12

【発売元】 吉通貿易株式会社