

【保管及び取扱い上の注意】
(1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)(4)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。また、開封後は使用期限内であっても、なるべく速やかに使用してください。(5)イヤホン、補聴器、メガネ、アクセサリ類、時計、寝具、家具、床、化学繊維、プラスチック類、皮製品などに付着すると変質することがありますので、付着しないように注意してください。(6)染めた髪につくと色落ちすることがあります。

製造販売元
万協製薬株式会社
三重県多気郡多気町五柱1169-142

万協製薬株式会社
「お客様相談室」
電話番号 0598-30-5376
受付時間 10:00~17:00
(ただし、土、日、祝日は除きます。)

本品についてのお問い合わせは、
お買い求めのお店又は上記にお願いいたします。

副作用被害救済制度
☎ 0120-149-931



耳などの かゆみに

プレドニゾン吉草酸エステル酢酸
エステル…0.15g配合(100mL中)

8つの有効成分配合



ヒフールER液プラス

第②類医薬品

開封口▼

ご使用に際して、この箱の記載内容を必ず読んでください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

△ 使用上の注意

※ してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
- 1.次の部位には使用しないでください
(1)水痘(水ぼうそう)、みずむし、たむし等または化膿している患部。
(2)目の周囲、粘膜等。
 - 2.顔面には、広範囲に使用しないでください
 - 3.長期連用しないでください

■ 相談すること

- 1.次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください
(1)医師の治療を受けている人。
(2)妊婦または妊娠していると思われる人。
(3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(4)患部が広範囲の人。
(5)湿潤やただれのひどい人。
- 2.使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、乾燥感、刺激感、熱感、ヒリヒリ感
皮 膚 (患部)	みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

3.5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

第②類医薬品 《鎮痒消炎薬》【販売名】ヒフールER液プラス 30mL

【効能・効果】湿疹、皮膚炎、あせも、かぶれ、かゆみ、虫さされ、じんましん
【用法・用量】1日数回、適量を患部に塗布してください。

耳に使用する場合の容器のご使用方法

- 本品は点耳薬ではありません。耳の中に直接滴下しないでください。
※本品に綿棒は付属されていません。



- 1.平らな所にティッシュ等を敷いた上でご使用ください。(薬液が過剰に出てこぼれる場合があります)
- 2.容器の先端を綿棒に垂直に軽く当ててください。そのまま先端が引込むように数秒押し付けると、少しずつ薬液が出てきます。これを数回繰り返して、綿棒全体にしみこませてください。
容器の本体部分を強く押さないでください。薬液が過剰に出る場合があります。
- 3.薬液がついた綿棒で患部に塗布してください。



※塗布する際は、耳の奥や鼓膜を傷つける恐れがありますので、**耳の奥まで綿棒を入れないでください。**
綿棒の先から約1.5cmの部分(綿棒の下)を持って、擦らずにやさしく塗布してください。

【用法・用量に関連する注意】(1)用法・用量を厳守してください。(2)小児(15才未満)に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(3)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。(4)外用にのみご使用ください。

【耳に使用する場合の注意】(1)本剤は点耳薬ではありませんので、耳の中に直接滴下しないでください。(2)薬液が耳の奥にたれないように、【耳に使用する場合の容器のご使用方法】を必ず守ってください。(3)長期連用しないでください。(目安として2週間以内)(4)鼓膜に穴が開いていることが疑われる場合、または耳だれが出ている場合は、使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。(5)使用后、耳が聞こえにくくなった場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。(6)本剤の使用開始目安年齢は10才以上です。なお、小児(15才未満)だけの使用はおやめください。(7)本剤塗布直後はイヤホンや補聴器を使用せず、十分に乾いたことを確認してから使用してください。(目安として1時間後)

【成分・分量】(100mL中) プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル0.15g、ジフェニヒドラン塩酸塩2.0g、クロタミノン3.0g、グリチルリチン酸二カリウム1.0g、アラントイン0.2g、イソプロピルメチルフェノール0.5g、リドカイン2.0g、l-メントール3.5g
添加物として、エデト酸ナトリウム水和物、ジブチルヒドロキシトルエン、乳酸、塩酸、プロピレングリコール、グリセリンを含有します。