

開け口

省資源化のため、箱が添付文書を兼ねています。
ご使用に際して、この箱の記載内容を必ず読んでください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

【販売名】エフカイα液

(鎮痒消炎薬)

第②類医薬品

【容量】50mL

【成分・分量】100mL中に次の成分を含みます。

デキサメタゾン酢酸エステル…25mg
ジフェンヒドラミン塩酸塩…1.0g
トメントール…3.0g
dl-カンフル…2.0g
インプロピルメチルフェノール…0.1g
添加物として、ジブチルヒドロキシトールエン、ラウロクロゴール、エタノールを含有します。

【効能・効果】

湿疹、皮膚炎、あせも、かぶれ、かゆみ、しもやけ、虫さされ、じんましん

【用法・用量】

1日数回、適量を患部に塗布してください。

(用法及び用量に関連する注意)

- 1) キャップをとりはずし、スポンジ部分を肌1に1~2回軽く押し当てて、スポンジに薬液をしみ込ませてからご使用ください。
- 2) 定められた用法・用量を守ってください。
- 3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 4) 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診察を受けてください。
- 5) 外用にのみ使用してください。

△ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の部位には使用しないでください。
次の。
(1) 水痘(水ぼうそう)、みずむし、たむし等又は化膿している患部。
(2) 創傷面、目の周囲、粘膜等。
(3) 顔面には、広範囲に使用しないでください。
2. 長期連用しないでください。

■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(4) 患部が広範囲の人。
(5) 潤滑やただれのひどい人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれみずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感
皮膚(患部)	

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931



べたつかず、**ズツと爽快!!**

虫さされ

かぶれ

かゆみ

皮膚炎

透明ローション

エフカイα液

50mL 第②類医薬品

セルフレメディケーション

税 控除 対象

べたつかず、清涼感のある速乾性液剤です。



【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光を避け、涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4) 火気に近づけないでください。
- (5) メガネ、時計、アクセサリー、プラスチック類、繊維製品、皮革製品、床や家具などの塗装面等に付着すると変質することがありますので、付着しないように注意してください。
- (6) 使用期限(外箱及び容器に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。
- (7) 使用後は必ずキャップを十分に締めてください。

発売元
株式会社プロダクトイノベーション
富山県富山市浜黒崎239番地
製造販売元
万協製薬株式会社
三重県多気郡多気町五桂1169-142

お客様相談室 電話 0598-30-5376
受付時間 10:00~17:00(ただし、土、祝日は除きます。)