

販売名:ヒフルH軟膏EX

〈外用痔疾用薬〉

第②類医薬品



効能・効果

きれ痔(さけ痔)・いぼ痔の痛み・かゆみ・はれ・出血の緩和及び消毒

用法・用量

1日1~3回、適量を肛門部に塗布してください。

〈用法・用量に関する注意〉

(1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

(2) 肛門部にのみ使用してください。

保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。

(2) 小児の手の届かない所に保管してください。

(3) 他の容器に入れ替えないでください。

(誤用の原因になったり品質が変わります。)

省資源化のため箱が説明書を兼ねています。ご使用に際して、この箱の説明を必ず読んでください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

成分・分量(100g中)

ヒドロコルチゾン酢酸エステル	0.5g
リドカイン	3.0g
酸化亜鉛	4.0g
イソプロピルメチルフェノール	0.1g
クロルフェニラミンマレイン酸塩	0.2g
アラントイン	1.0g
グリチルレチン酸	0.3g
トコフェロール酢酸エステル	3.0g
添加物として、マクロゴール、中鎖脂肪酸トリグリセリド、モノステアリン酸グリセリン、ソルビタンセスキオレイン酸エステル、ワセリンを含有します。	

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

製造販売元

万協製薬株式会社

三重県多気郡多気町五桂1169-142

万協製薬株式会社

「お客様相談室」

電話 0598-30-5376

受付時間 10:00~17:00

(ただし、土、日、祝日は除きます。)

⚠ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください

患部が化膿している人。

2. 長期連用しないでください

▣ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

(1) 医師の治療を受けている人。

(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。

(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
その他	刺激感、化膿

3. 10日間くらい使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

OPEN ▾