

服用前にこの添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第3類医薬品

鎮咳去痰薬

アストマゲンスルーM

ASTHMAGENTHROUGH

■製品の特徴

- 本剤は咳や痰、喉の炎症による喉のあれ・不快感を緩和する医薬品です。
- 本剤は口の中で素早く溶けて、生薬成分が喉の粘膜に直接作用します。
- 水で服用されますと効果が弱まりますので、水なしで服用してください。
- 飲みやすく服用量を調節しやすい顆粒剤ですので、3歳のお子様からご年配の方まで幅広くご使用になれます。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください

他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する
内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(4) 高熱の症状のある人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、
直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に
相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい

3. 5～6日服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

■効能・効果

たん、せき、のどの炎症による声がれ・
のどのあれ・のどの不快感



■用法・用量

次の量を水なしで服用してください。服用間隔は2時間以上おいてください。

年 齢	1 回 量	服用回数
成人(15歳以上)	1 包 	1 日 6 回
11歳以上 15歳未満	2／3包 	
7歳以上 11歳未満	1／2包 	
3歳以上 7歳未満	1／3包 	
3歳未満	服用しないでください	



水なしで服用

＜服用方法＞

本剤を舌の上に置いてゆっくり溶かすようにしながら、のどに運んでください。

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2) 用法・用量を厳守してください。

■成分・分量

成人1日量6包(4.2g)中

成 分	分 量
キキョウ末	84.0mg
セネガ末	4.2mg
カンゾウ末	102.0mg
キョウニン末	15.0mg
ニンジン末	84.0mg
アセンヤク末	8.4mg

添加物：エリスリトール、メタケイ酸アルミン酸Mg、バレイシヨデンブン、クエン酸、
l-メントール、タルク、無水ケイ酸、青色1号、黄色5号、香料、エタノール

■保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、速やかに服用してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。
お客様相談室 ☎ 06-6423-0565 (祝日を除く月～金曜日 10:00～17:00)

製造販売元



株式会社

阪本漢法製薬

兵庫県尼崎市名神町1-5-12

S2
A000
1CF-***A