

ご使用に際して、この箱の記載内容を必ず読んでください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

⚠ 使用上の注意

☒ **してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください。患部が化膿している人 2. 長期連用しないでください。

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください (1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

3. 10日間くらい使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
その他	刺激感、化膿

効能・効果 きれ痔(さけ痔)・いば痔の痛み・かゆみ・はれ・出血の緩和及び消毒

用法・用量 1日1~3回、適量を肛門部に塗布してください。

〈用法・用量に関する注意〉(1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(2) 肛門部にのみ使用してください。(3) 用法・用量を厳守してください。

成分・分量 (100g中) プレドニゾロン酢酸エステル 0.1g、リドカイン 3.0g、イソプロピルメチルフェノール 0.1g、クロルフェニラミンマレイン酸塩 0.2g、アラントイン 1.0g、グリチルレチン酸 0.3g、トコフェロール酢酸エステル 3.0g、l-メントール 0.1g 添加物として、マクロゴール、中鎖脂肪酸トリグリセリド、モノステアリン酸グリセリン、ソルビタンセスキオlein酸エステル、ワセリンを含有します。

保管及び取り扱い上の注意 (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります) (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。また、開封後は使用期限内であっても、なるべく速やかに使用してください。

開
封
口

上段が使用期限、下段が製造番号



副作用用被覆液清潔度 ☐ 0120-149-931

(火曜、土、日、祝日除く)

受付時間 10:00~17:00

電話 0598-30-5376

「お客様相談室」
万惣製薬株式会社

三重県多気郡多気町五桂1169-142

万惣製薬株式会社

製造販売元

エフ・エフ・エクス

第②類医薬品

外用薬用医薬品