

使用前にこの説明書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう保管してください。

販売名：ロートひとやすめ

眼科用薬

第3類医薬品

働き続けて溜まった目の疲れに

ロート ひとやすめ

1回使い切り目薬



こんな疲れ目の症状に

- 仕事終わりに目が重く疲れている
- 夕方になると視界がぼやける
- PCやスマホを長時間使っている
- 目が凝るような感じがする



溜まった目の疲れを回復する有効成分をこの1本に!

ピント調節筋のコリをほぐし
疲れ目に直接効く

ピント調節機能改善成分
基準※ **最大濃度配合**
ビタミンB₁₂
ネオスチグミンメチル硫酸塩



角膜にアプローチし、
疲れ目のもとに作用

ブルーライトやレンズこすれによる
角膜の炎症を抑える

アラントイン 硫酸亜鉛水和物

角膜保護

コンドロイチン硫酸
エステルナトリウム

栄養補給

タウリン

※基準とは厚生労働省が承認事務の効率化を図るために定めた医薬品の範囲

さらにこだわりの処方設計

じんわり
気持ちよい
さし心地


清涼剤配合
(β -メントール)

ひとみに
長く留まる
処方
設計

防腐剤
無添加

(ベンザルコニウム
塩化物、パラベンを
配合していません)

【開け方】



キャップが完全に
外れるまで回し
続けてください。
開封途中でキャ
ップをひっぱらない
でください。

目薬には、ソフトコンタクトレンズ装着中に使用できるものと使用できないものがあります。ソフトコンタクトレンズを装着したまま目薬を使用する場合は、外箱や添付文書を確認し、必ずソフトコンタクトレンズ装着中に使用できる目薬を使用しましょう。(カラーコンタクトレンズ装着中には使用しないでください。)

使用上の注意

相談すること



1. 次の人は、使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (3) 次の症状のある人
はげしい目の痛み
 - (4) 次の診断を受けた人
緑内障

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ、しみて痛い

3. 次の場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
 - (1) 目のかすみが改善されない場合
 - (2) 5～6日間使用しても症状がよくなりません

効能・効果

目の疲れ、目のかすみ(目やにの多いときなど)、目のかゆみ、眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)、紫外線その他の光線による眼炎(雪目など)、ハードコンタクトレンズ又はソフトコンタクトレンズを装着しているときの不快感

用法・用量

1回1～3滴、1日5～6回点眼してください。

用法・用量に関連する注意

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 容器の先を目やまぶた、まつ毛に触れさせないでください。[目にキズがついたり、汚染や異物混入(目やにやホコリ等)の原因となる]また、混濁したものは使用しないでください。
- (3) 点眼用에만使用してください。
- (4) コンタクトレンズを装着していないときも使用できます。



容器の先と目やまつ毛がふれることのないように

成 分

ネオスチグミンメチル硫酸塩…0.005%、アラントイン…0.1%、硫酸亜鉛水和物…0.1%、ビタミンB12…0.02%、タウリン…1.0%、コンドロイチン硫酸エステルナトリウム…0.25% 添加物として、ホウ酸、クエン酸Na、塩化Na、塩化K、エデト酸Na、ポビドン、ヒアルロン酸Na、ヒプロメロース、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、*l*-メントール、pH調節剤を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 未使用分は内袋に戻し、外箱に入れ、日光や蛍光灯の当たらない所に保管してください。品質を保持するため、自動車内や暖房器具の近くなど高温の場所(40℃以上)に放置しないでください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。なお、内袋開封後は、保管及び取扱い上の注意に従い、3ヵ月以内を目安にご使用ください。
- (6) 本品は、「1回使いきりタイプ」の点眼剤です。容器には薬液が押し出しやすいようにやや多く入っていますが、一度開封したものは液が残っていても必ず捨ててください。
- (7) ズボンの後ろポケット等に製品を入れると、キャップが開くことがありますのでご注意ください。

お問い合わせ先:お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、またご不満な点などをお聞かせいただけませんか。「あなたに応えたい」サポートデスクです。

東京:03-5442-6020 大阪:06-6758-1230

受付時間9:00～18:00(土、日、祝日を除く)

ROHTO®

ロート製薬株式会社
大阪市生野区巽西1-8-1