

ご使用に際して、この説明文を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第2類医薬品 湿疹、皮膚炎治療薬
エスペタ[®]クリーム

⚠ 使用上の注意

☒ してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください。本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 次の部位には使用しないでください。(1)水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等又は化膿している患部(2)目、目の周囲 (3)顔面には、広範囲に使用しないでください。
4. 長期連用しないでください。

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。(1)医師の治療を受けている人(2)妊娠又は妊娠していると思われる人(3)薬等によりアレルギー症状を起こしたことがある人(4)患部が広範囲の人(5)湿潤やただれのひどい人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
皮膚(患部)	みずむし・たむし等の白斑、にきび、化膿症状、持続的な刺激感、白くなる

3.5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

● 効能・効果 ●

湿疹、皮膚炎、あせも、かぶれ、かゆみ、しもやけ、虫さされ、じんましん

● 用法・用量 ●

通常1日1~数回適量を患部に塗布してください。

● 用法・用量に関する注意 ●

(1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(2) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。(3) 外用にのみ使用し、内服しないでください。(4) 使用部位をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないでください。また、おむつのあたる部分に使うときは、ぴったりとしたおむつやビニール製等の密封性のあるパンツは使用しないでください。(5) 化粧下、ひげそり後等に使用しないでください。

● 成分・分量 ● エスペタクリームは白色～淡黄白色のクリームです。

1g中 ベタメタゾン吉草酸エステル…1.2mg

添加物：パルミチン酸イソプロピル、白色ワセリン、ベヘニルアルコール、セタノール、モノステアリン酸グリセリン、セトマクロゴール1000、バラオキシ安息香酸プロピル、バラオキシ安息香酸メチル、ジブチルヒドロキシトルエン、ジメチルポリシロキサン、エデト酸ナトリウム水和物

● 保管及び取扱い上の注意 ●

(1) 直射日光の当たらない温氣の少ない涼しい所に密栓して保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 誤用を避け、品質を保持するため、他の容器に入れ替えないでください。(4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

製造販売元

シオノケミカル株式会社

東京都中央区八重洲2丁目10番10号

副作用被害救済制度

電話 0120-149-931

製品に関するお問い合わせ

シオノケミカル株式会社

学術情報本部

電話 03-5202-0213

受付時間 9:00~17:00

(土・日・祝日を除く)