



* 2 1 1 0 A 0 1 *

2021年10月 初版

ご使用の前に、この添付文書を必ずお読みください
また、必要な時に読めるように大切に保管してください

第2類医薬品

水虫・いんきんたむし・ぜにたむし治療剤

三ツ星 ダイヤテート軟膏

サリチル酸10%配合

製品の特長

三ツ星ダイヤテート軟膏は、有効成分トルナフタートの働きにより、かゆみをひきおこす原因である白癬菌を殺菌し、ジフェンヒドラミン塩酸塩が不快なかゆみを抑え、サリチル酸の抗菌作用と角質軟化作用により水虫・いんきんたむし・ぜにたむしを治療する軟膏剤です

⚠ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
次の部位には使用しないでください

- (1) 目や目の周囲、粘膜(例えば、口腔、鼻腔、瞼等)、陰のう、外陰部等
- (2) 湿疹
- (3) 湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 乳幼児
- (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (4) 患部が顔面又は広範囲の人
- (5) 患部が化膿している人
- (6) 「湿疹」か「みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし」かがはつきりしない人
(陰のうにかゆみ・ただれ等の症状がある場合は、湿疹等他の原因による場合が多い)

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

| 関係部位 | 症 状 |
|------|----------------------|
| 皮 ふ | 発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、刺激感 |

3. 2週間位使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】 水虫、いんきんたむし、ぜにたむし

【用法・用量】 適量をとり、1日1~3回患部に塗布又は塗擦する。

〈用法・用量に関する注意〉

- (1)患部やその周囲が汚れたまま使用しないでください
- (2)目に入らないように注意してください 万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください
- (3)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください
- (4)外用にのみ使用してください

【成分・分量】(本品100g中)

サリチル酸 10.0g ジフェンヒドラミン塩酸塩 1.0g

トルナフタート 2.0g

※添加物として白色ワセリン、香料を含有します

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください
- (2)小児の手の届かない所に保管してください
- (3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり、品質が変わる場合があります)
- (4)使用期限をすぎたものは使用しないでください

発売元

日邦薬品工業株式会社

東京都渋谷区代々木3-46-16

<http://www.nippo-yakuhin.jp/>

製造販売元

ダイヤ製薬株式会社

奈良県橿原市上品寺町515

お客様相談室TEL:0744-21-5588
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)