

皮膚軟化薬  
エフカイ20DX

開封口

第3類  
医薬品

省資源化のため、箱が添付文書を兼ねています。  
ご使用に際して、この箱の記載内容を必ず読んでください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

効能・効果

手指のあれ、ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、  
老人の乾皮症、さめ肌

用法・用量

1日数回適量を患部に塗擦してください。

〈用法・用量に関する注意〉(1)定められた用法・用量を守ってください。(2)小児(15歳未満)には使用させないでください。(3)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には眼科医の診療を受けてください。(4)外用にのみ使用してください。(5)本剤のついた手で、目等の粘膜に触れないでください。(6)化粧品ではないので、基礎化粧等の目的で顔面には使用しないでください。

⚠ 使用上の注意

※ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)  
次の部位には使用しないでください  
(1)顔面、目の周囲、粘膜(例えば口腔、鼻腔、脣等)等 (2)引っかき傷等の傷口、亀裂(ひび割れ)部位 (3)かさぶたの様に皮膚がはがれている所 (4)炎症部位(ただれ・赤く腫れている所)

※ 相談すること

1.第一次は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください(1)医師の治療を受けている人(2)薬等によりアレルギー症状を起こしたことがある人 2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、はれ、かゆみ、かぶれ、刺激感(痛み、熱感、びりびり感)、かさぶたの様に皮膚がはがれる状態

3.2週間位使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

尿素20%

保湿

ビタミンE  
血行促進

4つの  
有効成分  
配合

グリチルリチン酸  
-アンモニウム  
抗炎症

パンテノール  
組織修復促進

エフカイ20DX 40g 第3類医薬品

成分・分量(100g中)

尿素20.0g、トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE)0.5g、グリチルリチン酸-アンモニウム0.5g、パンテノール1.0g

添加物:ミリスチン酸イソプロピル、ステアリン酸、ステアリルアルコール、モノステアリン酸ソルビタン、ポリソルベート60、ジメチルポリシリコサン、ジブロビレングリコール、D-ソルビトール、バラベン、エドテ酸Na、グリシン、BHT、カルボキシビニルポリマー、ジソプロパノールアミン、乳酸

保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)(4)使用期限(箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく早く使用してください。

製造販売元 万協製薬株式会社 三重県多気郡多気町五桂1169-142

使用期限

内容量: 40g

製造番号

日本製



4 535653 002348

副作用用被害者情報登録番号 0120-149-931

(右記ル、上、日、祝日休業を除く)

受付時間

10:00~17:00

電話番号

0598-30-5376

万協製薬株式会社 [お客様相談室]

お問い合わせ

A2303