

効能・効果 滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

#### 用法・用量

成人(15歳以上)	1日1回	1回1瓶(100mL)
15歳未満	服用しないこと	

#### 成分・分量 1日量(100mL)中

リポフラビン(ビタミンB<sub>2</sub>)2mg、ピロドキシン塩酸塩(ビタミンB<sub>6</sub>)5mg、ニコチン酸アミド40mg、無水カフェイン50mg、タウリン3000mg、L-アルギニン塩酸塩300mg、L-バリン50mg、L-ロイシン100mg、L-イソロイシン50mg、L-アスパラギン酸マグネシウム・カリウム500mg、ローヤルゼリーチンキ50mg(原生薬換算量50mg)、インヨウカクエキス20mg(原生薬換算量110mg)、エノコギエキス15mg(原生薬換算量210mg)

添加物：白糖、クエン酸、安息香酸Na、パラベン、カラメル、香料(アルコール0.2mL以下)

●本剤の服用により、尿が黄色くなる場合がありますが、これは本剤中のリポフラビンによるもので心配ありません。

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

製造販売元

**アスゲン**製薬株式会社

岐阜県瑞浪市山田町字小洞2008

お客様相談窓口 ☎0572-68-1865

受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

金属：キャップ、ガラス：ビン

HapYcom

アスピーDX

4000 $\alpha$

タウリン3000mg アミノ酸類\*1000mg  
3種類の生薬成分

滋養強壮、

肉体疲労時の栄養補給に

第2類医薬品

100mL

#### 使用上の注意 相談すること

1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること●皮膚：発疹/消化器：胃部不快感、下痢 2.しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

#### 保管及び取り扱い上の注意

1.直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。2.小児の手の届かない所に保管すること。3.他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)。4.使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。5.本剤は生薬を配合しているため、まれに沈殿や浮遊物を生じることがありますが、薬効には変わりありません。よく振ってから服用してください。

1瓶(100mL)あたり85kcal  
\*アミノ酸類(L-バリン/L-ロイシン/  
L-イソロイシン/L-アルギニン塩酸塩/  
L-アスパラギン酸マグネシウム・カリウム)

使用期限

MADE IN JAPAN

製造番号



4 987313 620513