

漢方薬

新りさっど漢方便秘薬

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください

他の瀉下薬(下剤)

2. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください



■ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。
- (4) 胃腸が弱く下痢しやすい人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
消化器	はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

下痢

4. 5～6日間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

〈効能・効果〉

便秘、便秘に伴う頭重・のぼせ・湿疹・皮膚炎・ふきでもの(にきび)・食欲不振(食欲減退)・腹部膨満・腸内異常醗酵・痔などの症状の緩和

〈効能・効果に関連する注意〉

体力に関わらず、使用できる。

〈用法・用量〉

次の量を1日1回就寝前にかまずに服用すること。

ただし、初回は最小量を用い、便通の具合や状態を見ながら、半錠ないし1錠ずつ増量又は減量すること。

年齢	2～3日 便通がないとき	4日以上 便通がないとき
成人(15歳以上)	1錠～3錠	2錠～4錠
5歳以上～15歳未満	半錠～1錠半	1錠～2錠
5歳未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

〈成分・分量〉

本品1日量(4錠)中 大黃甘草湯エキス(9/20量)……………450mg

(ダイオウ1800mg、カンゾウ450mgより抽出)

添加物として、クロスCMC-Na、無水ケイ酸、セルロース、乳糖、タルク、ステアリン酸Mgを含有する。

〈保管及び取扱い上の注意〉

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) めれた手で取り扱わないでください。水分が錠剤につくと、表面が一部溶けて、変色又は色むらを生じることがあります。また、めれた錠剤をビンに戻すと他の錠剤にも影響を与えますので、戻さないでください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- (6) 本剤は、天然の生薬から抽出したエキスを原料にしていますので、開栓後の吸湿による色の変化(色が濃くなることがある)や、製品により錠剤の色調、味又は香りに多少の差異がでることがありますが、効果には変わりありませんので安心して服用してください。

本製品についてのお問い合わせは下記にお願い申し上げます。

大峰堂薬品工業株式会社 「消費者相談窓口」

〒635-0051 奈良県大和高田市根成柿574

電話 (0745) 22-3601

受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元 大峰堂薬品工業株式会社

奈良県大和高田市根成柿574