

開封口

省資源化のため、箱が添付文書を兼ねています。
ご使用に際して、この箱の記載内容を必ず読んでください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

外用鎮痛消炎薬

ヒコールメタシン液α

第2類医薬品

△ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください。

(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。(2) ぜんそくを起こしたことがある人。(3) 11歳未満の小児。

2. 次の部位には使用しないでください。

(1) 目の周囲、粘膜等。(2) 湿疹、かぶれ、傷口。(3) みずむし・たむし等又は化膿している患部。

3. 長期連用しないでください。

📞 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

(1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、熱感、乾燥感

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

成分・分量 (100g中)

インドメタシン……1.0g
ℓ-メントール………6.0g
トコフェロール酢酸エステル

………2.0g
添加物として、エデト酸ナトリウム、ヒプロメロース、マクロゴール300、ベンジルアルコール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、アジピン酸ジイソプロピル、ジイソプロパノールアミン、エタノールを含有します。

効能・効果

筋肉痛、肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛(五十肩など)、腱鞘炎(手・首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲(うちみ)、捻挫

用法・用量

1日4回を限度として適量を患部に塗布してください。

(用法・用量に関連する注意)

(1) 定められた用法・用量を厳守してください。(2) 11歳以上の小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(3) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。(4) 外用にのみ使用してください。(5) 1週間あたり50gを超えて使用しないでください。(6) 薬剤塗布後の患部をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないでください。(7) 塗布前にスポンジ面を患部に押し当て、スポンジに薬液をしみ込ませてから使用してください。(スポンジ面に十分しみ込んでいない状態で使用すると、スポンジが破れる場合があります。)

A2410

100mL

第2類医薬品

ヒコールメタシン液α

肩こり・腰痛・筋肉痛

ℓ-メントール
配合

インドメタシン
1.0%

ヒコールメタシン液α

肩こり

腰痛

筋肉痛

第2類医薬品

100mL

保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)(4) 本剤のついた手で、目などの粘膜に触れないでください。(5) メガネ、時計、アクセサリ等の金属類、衣類、プラスチック類、床や家具などの塗装面等に付着すると変質することがありますので、付着しないように注意してください。(6) 火気に近づけないでください。(7) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。また、開封後は使用期限内であっても、なるべく速やかに使用してください。

万協製薬株式会社「お客様相談室」

電話 0598-30-5376

受付時間 10:00～17:00

(ただし、土、日、祝日は除きます。)

製造販売元

万協製薬株式会社

三重県多気郡多気町五桂 1169-142

副作用被害救済制度

☎ 0120-149-931

内容量 100mL

MADE IN JAPAN

火気厳禁

第二石油類

水溶性 危険等級Ⅲ(エタノール)



4 535653 003215

使用期限

製造番号

1



MO03