

OPEN

乾燥性皮膚疾患治療薬

販売名：ヘパロイド泡フォーム

第2類医薬品 80g

肌自らが潤う力を助け、  
バリア機能を改善する

≪ヘパリン類似物質

肌を保水力を高める

≪ヒアルロン酸Na(2) ≪グリセリン

伸びのよい泡タイプ

フリー ステロイド・エタノール・メントール・  
パラベン・鉱物油・着色料

効能・効果

乾皮症、小児の乾燥性皮膚、ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、手足のひび・あかざれ、  
手指の荒れ、しもやけ(ただれを除く)、きず・やけどのあとの皮膚のしこり・つっぱり(顔面を除く)、  
打身・ねんざ後のはれ・筋肉痛・関節痛

用法・用量

1日1～数回、適量を患部にすりこむか、又はガーゼなどにのぼして貼ってください。

〈用法・用量に関連する注意〉

1. 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
2. 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合にはすぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には医師の診察を受けてください。
3. 外用にのみ使用してください。  
※出血のある傷口には使用しないでください。(血が止まりにくくなる場合があります。)  
※顔面にあるやけどのあと、傷あと、かさぶたには使用しないでください。
4. 容器を振ったり逆さまにしたりして使用しないでください。

ご使用に際して、この箱の記載内容を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

△ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 次の人は使用しないでください。  
出血性血液疾患(血友病、血小板減少症、紫斑病など)の人。わずかな出血でも重大な結果をきたすことが予想される人。(血液凝固抑制作用を有し出血を助長するおそれがあります。)
2. 次の部位には使用しないでください。  
目や目の周囲、粘膜(口腔、鼻腔、膈など)。

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
(1) 医師の治療を受けている人  
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人  
(3) 湿潤やただれのひどい人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、紫斑

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。



02



使用  
期限  
製造  
番号



DISM

HEPAROID FOAM

ヘパロイド泡フォーム

ヘパリン類似物質 0.3%

乾燥性皮膚疾患治療薬

泡タイプ 80g

第2類医薬品

成分・分量100g中

成分	分量	はたらき
ヘパリン類似物質	0.3g	水分保持作用、 抗炎症作用、血行促進作用

添加物：ヒアルロン酸ナトリウム(2)、プロピレングリコール、グリセリン、2-メタクリロイルオキシエチルホスホリルコリン・メタクリル酸ブチル共重合体液、クエン酸水和物、クエン酸ナトリウム水和物、安息香酸ナトリウム、セチル硫酸ナトリウム、ラウロマクロゴール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、香料

保管及び取扱い上の注意

1. 小児の手の届かない所に保管してください。
2. 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
3. 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。また、開封後は使用期限内であってもなるべく速やかに使用してください。
4. 吐出口やポンプ部を水洗いしないでください。

【使用後はポンプ部についた泡をふき取り、直射日光の当たらない涼しい所にキャップをして立てて保管してください。  
【持ち歩くとノズルから液がたれてくることがありますので、ご注意ください。】

お客様相談窓口 ☎0120-707-809

受付時間 9:00～18:00(年末年始を除く)

販売元：アンファー株式会社  
東京都千代田区丸の内二丁目7番2号  
www.angfa.jp

製造販売元：万協製薬株式会社  
三重県多気郡多気町五柱1169-142

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

MADE IN JAPAN