
チューブの開け方
キャップを裏返して差しこむ

使用期限

製造番号

4 570076 350324

1

OPEN▶

ヘパリン類似物質配合

喜遼妥®

ヒルロイゼクリーム

第2類医薬品

20g

手指のあれ、ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、手足のひび・あかぎれ、乾皮症、しもやけ（ただれを除く）

きず・やけどのあとの皮膚のしこり・つっぱり（顔面を除く）

ヒルロイゼクリーム ヘパリン類似物質配合

第2類医薬品

20g

手指のあれ、ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、手足のひび・あかぎれ、乾皮症、小児の乾燥性皮膚、しもやけ（ただれを除く）

きず・やけどのあとの皮膚のしこり・つっぱり（顔面を除く）

M022

A2409

ムコ多糖体多硫酸エステル

保湿

修復促進

抗炎症

血行促進

繰り返す乾燥肌に！

喜遼妥® ヒルロイゼクリーム

省資源化のため箱が添付文書を兼ねています。
ご使用に際して、この箱の記載内容を必ず読んでください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

〈外皮用薬〉
販売名 ヒルロイゼクリーム

第2類医薬品

⚠ 使用上の注意

してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）

1.次の人は使用しないでください。
  （1）出血性血液疾患（血友病、血小板減少症、紫斑病など）の人
  （2）わずかな出血でも重大な結果をきたすことが予想される人
    （血液凝固抑制作用を有し出血を助長するおそれがあります）
2.次の部位には使用しないでください。
  目、粘膜（口腔、鼻腔、膣など）

相談すること

1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  （1）医師の治療を受けている人
  （2）薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
  （3）湿潤やただれのひどい人
2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、紫斑

3.5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

手指のあれ、ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、手足のひび・あかぎれ、乾皮症、小児の乾燥性皮膚、しもやけ（ただれを除く）、傷・火傷のあとの皮膚のしこり・つっぱり（顔面を除く）、打ち身・捻挫後のはれ・筋肉痛・関節痛

用法・用量

1日1～数回、適量を患部に擦り込むか、またはガーゼ等にのばして貼ってください。

用法・用量に関連する注意

（1）定められた用法・用量を守ってください。（2）目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。（3）外用にのみ使用してください。*出血のある傷口には使用しないでください。（血が止まりにくくなることがあります。）*顔面にある傷あと、やけどのあとには使用しないでください。（4）小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

成分・分量

（100g中）ヘパリン類似物質 0.3g 添加物：グリセリン、流動パラフィン、スクワラン、プロピレングリコール、ワセリン、グリセリン脂肪酸エステル、パラフィン、マイクロクリスタリンワックス、パラベン、エデト酸Na、ヒアルロン酸Na

保管及び取扱い上の注意

（1）本剤のついた手で、目などの粘膜に触れないでください。（2）直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。（3）小児の手の届かない所に保管してください。（4）他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）（5）使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後は品質保持の点からなるべく早く使用してください。

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

販売元 **三井薬品株式会社**
東京都千代田区岩本町2-10-2 神田ウサミビル8階

製造販売元 **万協製薬株式会社**
三重県多気郡多気町五桂1169-142

三井薬品株式会社「お客様相談室」
電話 03-5809-2790
受付時間 10:00～17:00
（だたし、土、日、祝日は除きます。）

MADE IN JAPAN

ヘパリン類似物質配合
喜遼妥® ヒルロイゼクリーム
第2類医薬品

ヘパリン類似物質配合
喜遼妥® ヒルロイゼクリーム
第2類医薬品