




この箱は本剤とともに保管し、服用の際にはよくお読みください。

【販売名】サカンポー漢方便秘薬

漢方製剤

第2類医薬品

△ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください 他の瀉下薬（下剤）
 2. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください

🗨️ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
(3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)
(4) 胃腸が弱く下痢しやすい人
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
消化器	はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください 下痢
4. 5～6日間位服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】
便秘、便秘に伴う頭重・のぼせ・湿疹・皮膚炎・ふきものの（にきび）・食欲不振（食欲減退）・腹部膨満・腸内異常醗酵・痔などの症状の緩和
<効能・効果に関連する注意>
体力に関わらず、使用できます。



第2類医薬品

かん ぽう べん び やく
漢方便秘薬
大黃甘草湯
360錠
90日分



生薬末により
自然に近いお通じを
漢方
大黃甘草湯
360錠
90日分

便秘薬

便秘、便秘に伴う頭重・のぼせ・湿疹・皮膚炎・
ふきものの（にきび）・食欲不振（食欲減退）・
腹部膨満・腸内異常醗酵・痔などの症状の緩和

第2類医薬品



副作用被害救済制度 ☎0120-149-931




4 987076 627392

製造番号

使用期限

52



【用法・用量】
次の量を1日1回、就寝前（又は空腹時）に水かお湯で、かまずに服用してください。ただし、初回は最小量を用い、便通の具合や状態をみながら1錠ずつ増量又は減量してください。

年 齢	1 回 量	服用回数
成人（15歳以上）	3錠～4錠	1日1回
5歳以上 15歳未満	1錠～2錠	
5歳未満	服用しないでください	

<用法・用量に関連する注意>
(1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
(2) 定められた用法・用量を厳守してください。

【成分・分量】 成人1日最大服用量4錠中
日局 ダイオウ末 1,000mg、日局 カンゾウ末 250mg
添加物：ヒドロキシプロピルセルロース、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム

<成分・分量に関連する注意>
本剤は天然物（生薬）を用いていますので、錠剤の色調等が多少異なることがあります。

【保管及び取扱い上の注意】
(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
(2) 小児の手の届かない所に保管してください。
(3) 他の容器に入れ替えないでください。
（誤用の原因になったり品質が変わります。）
(4) ぬれた手で取り扱わないでください。
（湿気は錠剤の色や形が変わる原因になります。）
(5) ピンの中の詰め物は開封時に捨ててください。
(6) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

便秘薬を長期間にわたり使用すると、量を増やさないと効きにくくなる場合があります。
服用後に便通が改善した場合は服用を止め、2～3日間様子をみてください。過度な連続使用は控えて、正常な排便習慣を取り戻しましょう。

【お客様相談室】 ☎ 06-6423-0565
（祝日を除く月～金曜日10:00～17:00）

【製造販売元】 株式会社 阪本漢法製薬 兵庫県尼崎市名神町1-5-1 2



押して開ける

第2類医薬品

かん ぽう べん び やく
漢方便秘薬
(大黃甘草湯)

漢方製剤

便秘に効く

自然に近いお通じを

360錠
90日分

生薬末により自然に近いお通じを

便秘、便秘に伴う頭重・のぼせ・湿疹・皮膚炎・
ふきものの（にきび）・食欲不振（食欲減退）・
腹部膨満・腸内異常醗酵・痔などの症状の緩和