

有効成分そのまま！
飲みやすくなりました
1包あたり 29→19

第2類医薬品

しゃくやくかんぞうとう
芍薬甘草湯
顆粒
42包

満量処方

第2類医薬品

しゃくやくかんぞうとう
芍薬甘草湯
顆粒
42包

満量処方

第2類医薬品

しゃくやくかんぞうとう
芍薬甘草湯
満量処方

足指の
つりり！

顆粒
42包

持ち運びに便利な分包品

体力に関わらず使用でき、筋肉の急激なけいれんを伴う痛みのあるものの次の諸症
こむらがえり、筋肉のけいれん、
腹痛、腰痛

眠くなる成分は入っていません

体力に関わらず使用でき、筋肉の急激なけいれんを伴う痛みのあるものの次の諸症
こむらがえり、筋肉のけいれん、
腹痛、腰痛

【効能・効果】

体力に関わらず使用でき、筋肉の急激なけいれんを伴う痛みのあるものの次の諸症：こむらがえり、筋肉のけいれん、腹痛、腰痛

【用法・用量】

1日2～3回服用してください。

年 齢	1回量	服用回数
成人（15歳以上）	1包	1日 2～3回
7歳以上 15歳未満	2／3包	
4歳以上 7歳未満	1／2包	
2歳以上 4歳未満	1／3包	
2歳未満	1／4包	

※水かお湯で服用してください。

<用法・用量に関連する注意>

(1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
(2)1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合にのみ服用させてください。

【成分・分量】

成人1日量3包(1包1.0g)中 日局 芍薬甘草湯エキス 2.4g

成 分	分量	成 分	分量
日局 シャクヤク	6g	日局 カンゾウ	6g

より製した乾燥エキス
添加物：乳糖水和物、結晶セルロース、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム

<成分・分量に関連する注意>

本剤は天然物(生薬)のエキスをを用いていますので、顆粒の色調等が多少異なることがあります。

【保管及び取扱い上の注意】

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
(2)小児の手の届かない所に保管してください。
(3)他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
(4)湿気などにより薬が固化することがありますので、1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、速やかに服用してください。
(5)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

【お客様相談室】 ☎ 06-6423-0565
(祝日を除く月～金曜日10:00～17:00)

【製造販売元】

株式会社 阪本漢法製薬

兵庫県尼崎市名神町1-5-12

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

漢方製剤
第2類医薬品

押して開ける

服用前にこの箱の説明書を必ずお読みください。また、添付文書は挿入して
おりませんので、必要なときに読めるよう、この箱を大切に保管してください。

【販売名】サカンポー芍薬甘草湯顆粒

【特 徴】

- 「芍薬甘草湯」は漢方の鎮痛剤といわれ、急激におこる筋肉のけいれんを伴う痛み、こむらがえり、腹痛、腰痛などの症状を改善するための処方です。
- 本剤は「芍薬甘草湯」の最大分量の生薬より抽出したエキスを配合した満量処方で、飲みやすく服用量を調節しやすい、顆粒の頓服薬です。
- 本剤は眠くなる成分を含みませんので、仕事や車の運転にも支障はありません。

△ 使用上の注意 △

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

- 次の人は服用しないでください
(1)生後3ヵ月未満の乳児
(2)次の診断を受けた人：心臓病
- 症状があるときのみの服用にとどめ、連用しないでください

🗨 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1)医師の治療を受けている人
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人
(3)高齢者
(4)次の症状のある人：むくみ
(5)次の診断を受けた人：高血圧、腎臓病
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
うっ血性心不全、心室頻拍	全身のだるさ、動悸、息切れ、胸部の不快感、胸が痛む、めまい、失神等があらわれる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

- 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

4 987076 314599

製造番号

使用期限

紙箱

S2