

開け口

販売名

防風通聖散エキス錠「アスゲン」

第2類医薬品

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)ビンの中の詰め物は、輸送中に錠剤が破損するのを防ぐためのものです。開封後は不要となりますので取り除いてください。
- (5)ビンの蓋はよくしめてください。しめ方が不十分ですと湿気などのため変質することがあります。
- (6)本剤をぬれた手で取り扱わないでください。(水分が錠剤に付くと、表面が一部溶けて変色又は色むらを生じることがあります。)
- (7)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

製造販売元 **アスゲン製薬株式会社**
岐阜県瑞浪市山田町字小洞2008

お問い合わせ先 アスゲン製薬(株)
☎ 0572-68-1865(お客様相談窓口)
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

製造番号

使用期限

服用に際しては、この箱の説明書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

⚠【使用上の注意】

❌【してはいけないこと】

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
1.本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと・他の瀉下薬(下剤) 2.授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること

■【相談すること】

1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1)医師の治療を受けている人(2)妊婦又は妊娠していると思われる人(3)体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)(4)胃腸が弱く下痢しやすい人(5)発汗傾向の著しい人(6)高齢者(7)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人(8)次の症状のある人・むくみ、排尿困難(9)次の診断を受けた人・高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害 2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感、腹部膨満、はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛
精神神経系	めまい
その他	発汗、動悸、むくみ、頭痛

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。
その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つばり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腸間膜静脈硬化症	長期服用により、腹痛、下痢、便秘、腹部膨満等が繰り返しあらわれる。

3.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること・下痢、便秘 4.1ヵ月位(便秘に服用する場合には1週間位)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 5.長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

満量処方

防風通聖散錠

BOFUTSUSHOSAN TAB.

第2類医薬品

おなかまわりの
脂肪を落とす

満量処方

防風通聖散錠

BOFUTSUSHOSAN TAB.



飲みやすい
フィルムコート錠

肥満症、肥満に伴う便秘に

体力充実して、腹部に皮下脂肪が多く、便秘がちな方に

セルフメディケーション

税 控除 対象

540錠

1日3回【30日分】

第2類医薬品

【効能・効果】

体力充実して、腹部に皮下脂肪が多く、便秘がちなものの次の諸症：高血圧や肥満に伴う動悸・肩こり・のぼせ・むくみ・便秘、蓄膿症(副鼻腔炎)、湿疹・皮膚炎、ふきでもの(にきび)、肥満症

【用法・用量】

下記1回量を1日3回、食前又は食間に水又は白湯で服用してください。

成人(15歳以上)……1回 6錠
7歳以上15歳未満……1回 3錠
5歳以上 7 歳未満……1回 2錠
5歳未満……………服用しないこと

〈用法及び用量に関連する注意〉

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【成分・分量】

18錠(成人1日服用量：7.47g)中に、次の成分を含有します。

防風通聖散エキス……………6044.4mg

キキョウ	2.0g	サンシシ	1.2g
ビャクジュツ	2.0g	レンギョウ	1.2g
カンゾウ	2.0g	ハッカ	1.2g
オウゴン	2.0g	ケイガイ	1.2g
セッコウ	2.0g	ボウフウ	1.2g
ダイオウ	1.5g	マオウ	1.2g
トウキ	1.2g	ショウキョウ	0.4g
シャクヤク	1.2g	カッセキ	3.0g
センキュウ	1.2g	ボウショウ	1.5g

より製した乾燥エキス

添加物：乳糖、二酸化ケイ素、ポリビニルアルコール(部分けん化物)、ステアリン酸Mg、ヒプロメローズ、マクロゴール、酸化チタン、三酸化鉄を含有します。

〈成分及び分量に関連する注意〉

本剤は天然物(生薬)を用いていますので、錠剤の色が多少異なることがあります。

1

A1



4 987313 556102

紙 箱